

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	113	内用薬	ディアコミットドライシ ロップ分包250mg	250mg1包	507.10	60包	Meiji Seika ファルマ	スチリベン トール	クロバザム及びバルプロ酸 ナトリウムで十分な効果が 認められないDravet症候 群患者における間代発作又 は強直間代発作に対するク ロバザム及びバルプロ酸ナ トリウムとの併用療法	通常、1歳以上の患者には、スチリベン トールとして1日50mg/kgを1日2～3回に分割して食 事中又は食直後に経口投与する。投与は1日 20mg/kgから開始し、1週間以上の間隔をあ け10mg/kgずつ増量する。ただし、体重50kg 以上の患者には、スチリベン トールとして1日 1000mgから投与を開始し、1週間以上の間隔 をあけ500mgずつ増量する。  なお、1日最大投与量は50mg/kg又は 2500mgのいずれか低い方を超えないことと する。	劇、処方	2012.09.28	クロバザム及びバルプロ酸 ナトリウムで十分 な効果が認められない Dravet症候群患者にお ける間代発作又は強直 間代発作に対するクロ バザム及びバルプロ酸 ナトリウムとの併用療 法を効能・効果とする 新有効成分含有医薬品 (新有効成分)
			ディアコミットドライシ ロップ分包500mg	500mg1包	1,015.10	60包							
			ディアコミットカプセル 250mg	250mg1カプ セル	507.10	バラ包装（ボト ル入）60カプ セル							
2	214	内用薬	アイミクス配合錠LD	1錠	150.40	PTP：100錠 (10錠× 10)、500錠 (10錠× 50)、700錠 (14錠×50) バラ：500錠	大日本住友製 薬	イルベサル タン/アムロ ジピンベシ ル酸塩	高血圧症	通常、成人には1日1回1錠(イルベサルタン/ア ムロジピンとして100mg/5mg又は 100mg/10mg)を経口投与する。本剤は高血 圧治療の第一選択薬として用いない。	劇、処方	2012.09.28	高血圧症を効能・効果 とする新医療用配合剤 (新医療用配合剤)
			アイミクス配合錠HD	1錠	173.40	PTP：100錠 (10錠× 10)、500錠 (10錠× 50)、700錠 (14錠×50) バラ：500錠							
3	218	内用薬	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	254.00	56包、280包	武田薬品工業	オメガ-3脂 肪酸エチル	高脂血症	通常、成人にはオメガ-3脂肪酸エチルとして1 回2gを1日1回、食直後に経口投与する。た だし、トリグリセライド高値の程度により、1回 2g、1日2回まで増量できる。		2012.09.28	高脂血症を効能・効果 とする新有効成分含有 医薬品（新有効成分）
4	235	内用薬	アミティーザカプセル24 µg	24µg1カプセ ル	156.60	PTP：100カプ セル（10カプ セル×10）、 500カプセル （10カプセル× 50）	スキャンボ ファーマ	ルビプロス トン	慢性便秘症（器質的疾患に よる便秘を除く）	通常、成人にはルビプロス トンとして1回24µ gを1日2回、朝食後及び夕 食後に経口投与する。な お、症状により適宜減量 する。	処方	2012.06.29	慢性便秘症（器質的疾 患による便秘を除く） を効能・効果とする新 有効成分含有医薬品 (新有効成分)

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売所	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	396	内用薬	スイニー錠100mg	100mg1錠	83.00	100錠 (PTP10錠×10)、140錠 (PTP14錠×10)、500錠 (PTP10錠×50、バラ)	三和化学研究所	アナグリプチン	2型糖尿病 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る  1. 食事療法、運動療法のみ 2. 食事療法、運動療法に加えてα-グルコシダーゼ阻害剤を使用 3. 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用 4. 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用 5. 食事療法、運動療法に加えてチアゾリジン系薬剤を使用	通常、成人にはアナグリプチンとして1回100mgを1日2回朝夕に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら1回量を200mgまで増量することができる。	処方	2012.09.28	2型糖尿病を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
6	399	内用薬	ブフェニール錠500mg	500mg1錠	449.40	250錠	オーファンバシフィック	フェニル酪酸ナトリウム	尿素サイクル異常症	通常、成人及び体重20kg以上の小児にはフェニル酪酸ナトリウムとして1日あたり9.9～13.0g/m <sup>2</sup> （体表面積）を3回～6回に分割し、食事又は栄養補給とともに若しくは食直後に経口投与する。体重20kg未満の新生児、乳幼児及び小児にはフェニル酪酸ナトリウムとして1日あたり450～600mg/kgを3回～6回に分割し、食事又は栄養補給とともに若しくは食直後に経口投与する。  投与は少量より開始し、患者の状態、血中アンモニア濃度、血漿中アミノ酸濃度等を参考に適宜増減する。また、食事制限及び必須アミノ酸補給等の十分な栄養管理の下に投与する。	処方	2012.09.28	尿素サイクル異常症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
			ブフェニール顆粒94%	94%1g	831.70	266g							
7	429	内用薬	ヴोटロリエント錠200mg	200mg1錠	4,027.20	20錠（10錠×2）PTP	グラクソ・スミスクライン	バソバニブ塩酸塩	悪性軟部腫瘍	通常、成人にはバソバニブとして1日1回800mgを食事の1時間以上前又は食後2時間以降に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2012.09.28	悪性軟部腫瘍を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
8	821	内用薬	メサペイン錠5mg	5mg1錠	178.30	40錠、100錠	帝國製薬	メサドン塩酸塩	他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛  中等度から高度の疼痛を伴う各種癌	本剤は、他の強オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する。  通常、成人に対し初回投与量は本剤投与前に使用していた強オピオイド鎮痛剤の用法・用量を勘案して、メサドン塩酸塩として1回5～15mgを1日3回経口投与する。  その後の投与量は患者の症状や状態により適宜増減する。	劇、麻、処方	2012.09.28	他の強オピオイド鎮痛剤で治療困難な中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
			メサペイン錠10mg	10mg1錠	338.50	40錠、100錠							
9	117	注射薬	ジブレキサ筋注用10mg	10mg1瓶	2,067	10バイアル	日本イーライリリー	オランザピン	統合失調症における精神運動興奮	通常、成人にはオランザピンとして1回10mgを筋肉内注射する。  効果不十分な場合には、1回10mgまでを追加投与できるが、前回の投与から2時間以上あけること。また、投与回数は、追加投与を含め1日2回までとすること。  年齢、症状に応じて減量を考慮すること。	劇、処方	2012.09.28	統合失調症における精神運動興奮を効能・効果とする新投与経路医薬品（新投与経路）
10	131	注射薬	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	2mg0.05mL1瓶	159,289	1バイアル	バイエル薬品	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性	アフリベルセプト（遺伝子組換え）として2mg（0.05mL）を1か月ごとに1回、連続3回（導入期）硝子体内投与する。その後の維持期においては、通常、2か月ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節する。	劇、処方、生物	2012.09.28	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
11	249	注射薬	ソマチユリン皮下注60mg	60mg1筒	180,360	1シリンジ	帝人ファーマ	ランレオチド酢酸塩	下記疾患における成長ホルモン、IGF-I（ソマトメジン-C）分泌過剰状態及び諸症状の改善  先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合）	通常、成人にはランレオチドとして90mgを4週毎に3か月間、深部皮下に注射する。その後は患者の病態に応じて60mg、90mg又は120mgを4週毎に投与する。	劇、処方	2012.06.29	先端巨大症・下垂体性巨人症（外科的処置で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合）における成長ホルモン、IGF-I（ソマトメジン-C）分泌過剰状態及び諸症状の改善を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
			ソマチユリン皮下注90mg	90mg1筒	253,900	1シリンジ							
			ソマチユリン皮下注120mg	120mg1筒	323,624	1シリンジ							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
12	612	注射薬	タイガシル点滴静注用 50mg	50mg1瓶	12,188	1バイアル	ファイザー	チゲサイクリン	(適応菌種) 本剤に感性の大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、アシネトバクター属  ただし、他の抗菌薬に耐性を示した菌株に限る  (適応症) 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎	通常、成人には、チゲサイクリンとして初回用量100mgを30～60分かけて点滴静脈内投与、以後12時間ごとに50mgを30～60分かけて点滴静脈内投与する。	劇、処方	2012.09.28	深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
13	225	外用薬	シープリ吸入用カプセル 50µg	50µg1カプセル	199.20	14カプセル（7カプセル×2シート、フリーズヘラー1個）、28カプセル（7カプセル×4シート）	ノバルティスファーマ	グリコピロニウム臭化物	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解	通常、成人には1回1カプセル（グリコピロニウムとして50µg）を1日1回本剤専用の吸入用器具を用いて吸入する。	処方	2012.09.28	慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
14	421	外用薬	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	7.7mg1枚	156,442.60	8枚（分包1枚×8）	ノーベルファーマ	カルムスチン	悪性神経腫腫	通常、成人には、腫瘍切除腔の大きさや形状に応じて、本剤8枚（カルムスチンとして61.6mg）又は適宜減じた枚数を脳腫瘍切除術時の切除面を被覆するように留置する。	劇、処方	2012.09.28	悪性神経腫腫を効能・効果とする新有効成分含有医薬品（新有効成分）
15	612	外用薬	トービー吸入液300mg	300mg5mL1管	8,633.80	5mL×14本	ノバルティスファーマ	トブラマイシン	嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染に伴う症状の改善	1回300mgを1日2回28日間噴霧吸入する。その後28日間休業する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。	劇、処方	2012.09.28	嚢胞性線維症における緑膿菌による呼吸器感染に伴う症状の改善を効能・効果とする新投与経路医薬品（新投与経路）

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌別冊の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。