

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

| 番号 | 薬効分類 | 区分  | 商品名             | 規格単位       | 薬価(円)    | 包装単位                                        | 製造販売       | 成分名          | 効能・効果                        | 用法・用量                                                                                                                                                                                                     | 規制等  | 承認年月日    | 備考         |
|----|------|-----|-----------------|------------|----------|---------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 1  | 392  | 内用薬 | ニシスタゴンカプセル50mg  | 50mg1カプセル  | 215.90   | 100カプセル(バラ)                                 | マイラン製薬     | システアミン酒石酸塩   | 腎性シスチン症                      | 通常、12歳未満の患者又は体重50kg未満の患者には、システアミンとして1日1.3g/m <sup>2</sup> (体表面積)、体重50kgを超える12歳以上の患者には、システアミンとして1日2gを4回に分割し経口投与する。投与は少量より開始し、4~6週間以上かけて上記用量まで漸増する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日1.95g/m <sup>2</sup> (体表面積)を上限とする。 | 劇、処方 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
|    |      |     | ニシスタゴンカプセル150mg | 150mg1カプセル | 571.10   | 100カプセル(バラ)                                 |            |              |                              |                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |
| 2  | 396  | 内用薬 | カナグリフ錠100mg     | 100mg1錠    | 205.50   | 100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10)、500錠(10錠×50)、500錠 | 田辺三菱製薬     | カナグリフロジン水和物  | 2型糖尿病                        | 通常、成人にはカナグリフロジンとして100mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。                                                                                                                                                              | 処方   | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
| 3  | 429  | 内用薬 | アレセンサカプセル20mg   | 20mg1カプセル  | 901.70   | 14カプセル(バラ)                                  | 中外製薬       | アレクチニブ塩酸塩    | ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | 通常、成人にはアレクチニブとして1回300mgを1日2回経口投与する。                                                                                                                                                                       | 劇、処方 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
|    |      |     | アレセンサカプセル40mg   | 40mg1カプセル  | 1,763.90 | 98カプセル(バラ)                                  |            |              |                              |                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |
| 4  | 429  | 内用薬 | ザイティガ錠250mg     | 250mg1錠    | 3,690.90 | 100錠(10錠×10)                                | ヤンセンファーマ   | アピラテロン酢酸エステル | 去勢抵抗性前立腺癌                    | プレドニゾンとの併用において、通常、成人にはアピラテロン酢酸エステルとして1日1回1,000mgを空腹時に経口投与する。                                                                                                                                              | 劇、処方 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
| 5  | 429  | 内用薬 | ジャカビ錠5mg        | 5mg1錠      | 3,706.80 | 20錠(PTP)、120錠(PTP)                          | ノバルティスファーマ | ルキシロチニブリン酸塩  | 骨髄線維症                        | 通常、成人には本剤を1日2回、12時間毎を目安に経口投与する。用量は、ルキシロチニブとして1回5mg~25mgの範囲とし、患者の状態により適宜増減する。                                                                                                                              | 劇、処方 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
| 6  | 429  | 内用薬 | ラバリムス錠1mg       | 1mg1錠      | 1,285.00 | PTP30錠(10錠×3)                               | ノーベルファーマ   | シロリムス        | リンパ脈管筋腫症                     | 通常、成人にはシロリムスとして2mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日1回4mgを超えないこと。                                                                                                                                          | 劇、処方 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |

| 番号                         | 薬効分類   | 区分       | 商品名                                     | 規格単位                       | 薬価(円)                    | 包装単位                          | 製造販売        | 成分名        | 効能・効果                                                    | 用法・用量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 規制等    | 承認年月日    | 備考         |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----------|----------|
| 7                          | 449    | 内用薬      | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル                | 10mL1瓶                     | 421.10                   | ボトル PET容器 10mL:1本 (デイスベンサー付属) | 鳥居薬品        | 標準化スギ花粉エキス | スギ花粉症(減感作療養法)                                            | <p>1. 増量期(1~2週目)</p> <p>通常、成人及び12歳以上の小児には、増量期として投与開始後2週間、以下の用量を1日1回、舌下に滴下し、2分間保持した後、飲み込む。その後5分間は、うがい・飲食を控える。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1週目増量期</th> <th colspan="2">2週目増量期</th> </tr> <tr> <th>シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル</th> <th>シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル</th> <th>シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル</th> <th>シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回目</td> <td>0.2mL</td> <td>1回目</td> <td>0.2mL</td> </tr> <tr> <td>2回目</td> <td>0.2mL</td> <td>2回目</td> <td>0.2mL</td> </tr> <tr> <td>3回目</td> <td>0.4mL</td> <td>3回目</td> <td>0.4mL</td> </tr> <tr> <td>4回目</td> <td>0.4mL</td> <td>4回目</td> <td>0.4mL</td> </tr> <tr> <td>5回目</td> <td>0.8mL</td> <td>5回目</td> <td>0.8mL</td> </tr> <tr> <td>6回目</td> <td>0.8mL</td> <td>6回目</td> <td>0.8mL</td> </tr> <tr> <td>7回目</td> <td>1mL</td> <td>7回目</td> <td>1mL</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 維持期(3週目以降)</p> <p>増量期終了後、維持期として、シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパックの全量(1mL)を1日1回、舌下に滴下し、2分間保持した後、飲み込む。その後5分間は、うがい・飲食を控える。</p> | 1週目増量期 |          | 2週目増量期     |  | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル | 1回目 | 0.2mL | 1回目 | 0.2mL | 2回目 | 0.2mL | 2回目 | 0.2mL | 3回目 | 0.4mL | 3回目 | 0.4mL | 4回目 | 0.4mL | 4回目 | 0.4mL | 5回目 | 0.8mL | 5回目 | 0.8mL | 6回目 | 0.8mL | 6回目 | 0.8mL | 7回目 | 1mL | 7回目 | 1mL | 劇、処方 | 2014.1.17 | 新投与経路医薬品 |
|                            |        |          | 1週目増量期                                  |                            | 2週目増量期                   |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
|                            |        |          | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル                | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル | シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル | シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル    |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 1回目                        | 0.2mL  | 1回目      | 0.2mL                                   |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 2回目                        | 0.2mL  | 2回目      | 0.2mL                                   |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 3回目                        | 0.4mL  | 3回目      | 0.4mL                                   |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 4回目                        | 0.4mL  | 4回目      | 0.4mL                                   |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 5回目                        | 0.8mL  | 5回目      | 0.8mL                                   |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 6回目                        | 0.8mL  | 6回目      | 0.8mL                                   |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 7回目                        | 1mL    | 7回目      | 1mL                                     |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル | 10mL1瓶 | 1,006.60 | ボトル PET容器 10mL:1本 (デイスベンサー付属)           |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLパック | 1mL1包  | 100.80   | 分包品 アルミラミネート容器 1mL:14包(1シート:1包×7連 2シート) |                            |                          |                               |             |            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |            |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 8                          | 622    | 内用薬      | デルティバ錠50mg                              | 50mg1錠                     | 6,125.00                 | [PTP] 60錠(10錠×6)              | 大塚製薬        | デラマニド      | <p>&lt;適応菌種&gt; 本剤に感性的結核菌</p> <p>&lt;適応症&gt; 多剤耐性肺結核</p> | 通常、成人にはデラマニドとして1回100mgを1日2回朝、夕に食後経口投与する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 劇、処方   | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |
| 9                          | 625    | 内用薬      | スンペブラカプセル100mg                          | 100mg1カプセル                 | 3,280.70                 | 28カプセル(14カプセル×2)              | ブリストル・マイヤーズ | アスナプレビル    | セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変における次のいずれかのウイルス血症の改善    | 通常、成人にはアスナプレビルとして1回100mgを1日2回経口投与する。本剤はダクラタスビル塩酸塩と併用し、投与期間は24週間とする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 劇、処方   | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |  |                          |                            |                          |                            |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |     |     |     |      |           |          |

| 番号 | 薬効分類 | 区分  | 商品名            | 規格単位        | 薬価(円)      | 包装単位           | 製造販売        | 成分名        | 効能・効果                                                                                                                      | 用法・用量                                                                                                                                                                                                                                                                         | 規制等  | 承認年月日     | 備考         |
|----|------|-----|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 10 | 625  | 内用薬 | ダクルインザ錠60mg    | 60mg1錠      | 9,186.00   | 14錠(14錠×1) PTP | プリストル・マイヤーズ | ダクラタスビル塩酸塩 | セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変における次のいずれかのウイルス血症の改善<br>(1)インターフェロンを含む治療法に不適格の未治療あるいは不耐容の患者<br>(2)インターフェロンを含む治療法で無効となった患者 | 通常、成人にはダクラタスビルとして1回60mgを1日1回経口投与する。本剤はアスナプレビルと併用し、投与期間は24週間とする。                                                                                                                                                                                                               | 劇、処方 | 2014.7.4  | 新有効成分含有医薬品 |
| 11 | 211  | 注射薬 | レスピア静注・経口液60mg | 60mg3mL1瓶   | 810.00     | 10バイアル         | ノーベルファーマ    | 無水カフェイン    | 早産・低出生体重児における原発性無呼吸(未熟児無呼吸発作)                                                                                              | 初回投与：通常、カフェインクエン酸塩として20mg/kg(本剤1mL/kg)を30分かけて静脈内投与する。<br>維持投与：初回投与から24時間後以降に、通常、カフェインクエン酸塩として5mg/kg(本剤0.25mL/kg)を1日1回、10分かけて静脈内投与又は経口投与する。なお、症状に応じて、10mg/kg(本剤0.5mL/kg)まで増量できる。                                                                                               | 処方   | 2014.3.24 | 新投与経路医薬品   |
| 12 | 219  | 注射薬 | トレプロスト注射液20mg  | 20mg20mL1瓶  | 186,277.00 | 1バイアル          | 持田製薬        | トレプロスチニル   | 肺動脈性肺高血圧症(WHO機能分類クラスII、III及びIV)                                                                                            | 通常、成人にはトレプロスチニルとして1.25ng/kg/分の投与速度で持続静脈内投与又は持続皮下投与を開始する。この初期投与速度が本剤の全身性の副作用により耐えられない場合は、投与速度を0.625ng/kg/分に減量する。<br>患者の状態を十分に観察しながら、原則、最初の4週間は、1週間当たり最大1.25ng/kg/分で増量し、その後は臨床症状に応じて1週間あたり最大2.5ng/kg/分を超えて増量する場合、患者の忍容性を十分確認しながら慎重に投与する。最適投与速度の決定にあたっては、本剤の副作用と肺高血圧症状の改善を指標とする。 | 劇、処方 | 2014.3.24 | 新有効成分含有医薬品 |
|    |      |     | トレプロスト注射液50mg  | 50mg20mL1瓶  | 339,537.00 | 1バイアル          |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |            |
|    |      |     | トレプロスト注射液100mg | 100mg20mL1瓶 | 534,711.00 | 1バイアル          |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |            |
|    |      |     | トレプロスト注射液200mg | 200mg20mL1瓶 | 842,076.00 | 1バイアル          |             |            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |            |

| 番号 | 薬効分類 | 区分  | 商品名            | 規格単位              | 薬価(円)      | 包装単位               | 製造販売       | 成分名                   | 効能・効果                            | 用法・用量                                                                                                  | 規制等     | 承認年月日    | 備考         |
|----|------|-----|----------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| 13 | 395  | 注射薬 | ビプリブ点滴静注用400単位 | 400単位1瓶           | 300,146.00 | 1バイアル              | シャイアー・ジャパン | ベラグルセラゼ アルファ (遺伝子組換え) | ゴーシェ病の諸症状(貧血、血小板減少症、肝脾腫及び骨症状)の改善 | 通常、ベラグルセラゼ アルファ(遺伝子組換え)として、1回体重1kgあたり60単位を隔週点滴静脈内投与する。                                                 | 劇、処方、生物 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
| 14 | 424  | 注射薬 | ジェブタナ点滴静注60mg  | 60mg1.5mL1瓶(溶解液付) | 593,069.00 | 1.5mL×1バイアル(溶解液添付) | サノフィ       | カバジタキセル アセトン付加物       | 前立腺癌                             | ブレドニゾンとの併用において、通常、成人に1日1回、カバジタキセルとして25mg/m <sup>2</sup> (体表面積)を1時間かけて3週間間隔で点滴静注する。なお、患者の状態により適宜減量すること。 | 毒、処方    | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
| 15 | 429  | 注射薬 | オブジーボ点滴静注20mg  | 20mg2mL1瓶         | 150,200.00 | 2mL:1バイアル          | 小野薬品工業     | ニボルマブ(遺伝子組換え)         | 根治切除不能な悪性黒色腫                     | 通常、成人にはニボルマブ(遺伝子組換え)として、1回2mg/kg(体重)を3週間間隔で点滴静注する。                                                     | 処方、生物   | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |
|    |      |     | オブジーボ点滴静注100mg | 100mg10mL1瓶       | 729,849.00 | 10mL:1バイアル         |            |                       |                                  |                                                                                                        |         |          |            |

| 番号 | 薬効分類 | 区分  | 商品名                | 規格単位                     | 薬価(円)      | 包装単位                                                                                | 製造販売                      | 成分名                                    | 効能・効果                        | 用法・用量                                                                                                                                                                                                                                   | 規制等       | 承認年月日    | 備考         |  |  |
|----|------|-----|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--|--|
| 16 | 634  | 注射薬 | オルプロロキス静注用<br>500  | 500国際単位1<br>瓶（溶解液<br>付）  | 106,104.00 | 500国際単位×<br>1バイアル [プ<br>レフィルドシリ<br>ンジ (0.325%<br>塩化ナトリウム<br>溶液5mL×1シ<br>リンジ付き) ]    | バイオジェ<br>ン・アイデッ<br>ク・ジャパン | エフトレノ<br>ナコグ アル<br>ファ (遺<br>伝子組換<br>え) | 血液凝固第IX因子欠乏患<br>者における出血傾向の抑制 | 本剤を添付の溶解液全量で溶解し、数分かけて<br>緩徐に静脈内に注射する。<br>通常、1回体重1kg当たり50国際単位を投与す<br>るが、患者の状態に応じて適宜増減する。<br>定期的に投与する場合、通常、体重1kg当たり<br>50国際単位を週1回投与、又は100国際単位を<br>10日に1回投与から開始する。以降の投与量及<br>び投与間隔は患者の状態に応じて適宜調節する<br>が、1回の投与量は体重1kg当たり100国際単<br>位を超えないこと。 | 処方、生<br>物 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品 |  |  |
|    |      |     | オルプロロキス静注用<br>1000 | 1000国際単位<br>1瓶（溶解液<br>付） | 209,985.00 | 1000国際単位<br>×1バイアル<br>[プレフィルド<br>シリンジ<br>(0.325%塩化<br>ナトリウム溶液<br>5mL×1シリン<br>ジ付き) ] |                           |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |            |  |  |
|    |      |     | オルプロロキス静注用<br>2000 | 2000国際単位<br>1瓶（溶解液<br>付） | 415,572.00 | 2000国際単位<br>×1バイアル<br>[プレフィルド<br>シリンジ<br>(0.325%塩化<br>ナトリウム溶液<br>5mL×1シリン<br>ジ付き) ] |                           |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |            |  |  |
|    |      |     | オルプロロキス静注用<br>3000 | 3000国際単位<br>1瓶（溶解液<br>付） | 619,531.00 | 3000国際単位<br>×1バイアル<br>[プレフィルド<br>シリンジ<br>(0.325%塩化<br>ナトリウム溶液<br>5mL×1シリン<br>ジ付き) ] |                           |                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |            |  |  |

| 番号 | 薬効分類 | 区分  | 商品名              | 規格単位                                | 薬価(円)      | 包装単位                                   | 製造販売       | 成分名                     | 効能・効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用法・用量                                                                                       | 規制等    | 承認年月日    | 備考                 |
|----|------|-----|------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|
| 17 | 634  | 注射薬 | バイクロット配合静注用      | (第VIIa因子1.5mg第X因子15mg) 1瓶<br>(溶解液付) | 263,394.00 | バイクロット配合静注用：1バイアル、日本薬局方注射用水2.5mL：1バイアル | 化学及血清療法研究所 | 乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子 | 血液凝固第VIII因子又は血液凝固第IX因子に対するインヒビターを保有する患者の出血抑制                                                                                                                                                                                                                                                           | 本剤1バイアルを添付の日本薬局方注射用水で溶解し、活性化人血液凝固第VII因子として1回の注射当たり症状に応じて60～120µg/kgを8時間以上の間隔をあけて静脈内に緩徐に注射する | 処方、特生物 | 2014.7.4 | 新有効成分含有医薬品・新医療用配合剤 |
| 18 | 641  | 注射薬 | アネメトロ口点滴静注液500mg | 500mg100mL1瓶                        | 1,252.00   | 5バイアル                                  | ファイザー      | メトロニダゾール                | 1. 嫌気性菌感染症<br><適応菌種><br>本剤に感性的のペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属、ポルフィロモナス属、フソバクテリウム属、クロストリジウム属、ユーバクテリウム属<br><適応症><br>・敗血症 ・深在性皮膚感染症 ・外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ・骨髄炎<br>・肺炎、肺膿瘍、膿胸 ・骨盤内炎症性疾患 ・腹膜炎、腹腔内膿瘍 ・胆嚢炎、肝膿瘍<br>・化膿性髄膜炎 ・脳膿瘍<br>2. 感染性腸炎<br><適応菌種> 本剤に感性的のクロストリジウム・ディフィシル<br><適応症> 感染性腸炎（偽膜性大腸炎を含む）<br>3. アメーバ赤痢 | 通常、成人にはメトロニダゾールとして1回500mgを1日3回、20分以上かけて点滴静注する。なお、難治性又は重症感染症には症状に応じて、1回500mgを1日4回投与できる。      | 処方     | 2014.7.4 | 新投与経路医薬品           |

| 番号 | 薬効分類 | 区分  | 商品名           | 規格単位    | 薬価(円)     | 包装単位               | 製造販売         | 成分名                            | 効能・効果                                                                          | 用法・用量                                                             | 規制等  | 承認年月日     | 備考                 |
|----|------|-----|---------------|---------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|
| 19 | 225  | 外用薬 | アノーロエリブタ7吸入用  | 7吸入1キット | 1,997.20  | アノーロエリブタ7吸入用×1     | グラクソ・スミスクライン | ウメクリジニウム臭化物/ピランテロールトリフェニル酢酸塩   | 慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解（長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合） | 通常、成人にはアノーロエリブタ1吸入（ウメクリジニウムとして62.5μg及びピランテロールとして25μg）を1日1回吸入投与する。 | 処方   | 2014.7.4  | 新有効成分含有医薬品・新医療用配合剤 |
| 20 | 252  | 外用薬 | ミレーナ52mg      | 1個      | 26,984.30 | 1個×1、1個×3          | バイエル薬品       | レボノルゲストレル                      | 避妊<br>過多月経<br><br>(下線部今回追加)                                                    | 本剤1個を子宮腔内に装着する。                                                   | 処方   | 2014.6.20 | 新効能医薬品             |
| 21 | 269  | 外用薬 | ドボベツト軟膏       | 1g      | 276.40    | 15g×1、15g×10、30g×1 | レオ ファーマ      | カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 尋常性乾癬                                                                          | 通常、1日1回、患部に適量塗布する。                                                | 劇、処方 | 2014.7.4  | 新医療用配合剤            |
| 22 | 629  | 外用薬 | クレナフィン爪外用液10% | 10%1g   | 1,657.50  | 3.56g (4mL)×10     | 科研製薬         | エフィナコナゾール                      | <適応菌種> 皮膚糸状菌（トリコフィトン属）<br><適応症> 爪白癬                                            | 1日1回罹患爪全体に塗布する。                                                   | 処方   | 2014.7.4  | 新有効成分含有医薬品         |

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。