

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	399	内用薬	プラケニル錠200mg	200mg1錠	418.90円	84錠[14錠(PTP×6)]	サノフィ	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス	通常、ヒドロキシクロロキン硫酸塩として200mg又は400mgを1日1回食後に経口投与する。 ただし、1日の投与量はブローカ式桂変法により求められる以下の理想体重に基づく用量とする。 女性患者の理想体重(kg) = (身長(cm) - 100) × 0.85 男性患者の理想体重(kg) = (身長(cm) - 100) × 0.9 1. 理想体重が31kg以上46kg未満の場合、1日1回1錠(200mg)を経口投与する。 2. 理想体重が46kg以上62kg未満の場合、1日1回1錠(200mg)と1日1回2錠(400mg)を1日おきに経口投与する。 3. 理想体重が62kg以上の場合、1日1回2錠(400mg)を経口投与する。	毒、処方	2015.7.3	新有効成分
2	399	内用薬	オフエブカプセル100mg	100mg1カプセル	4,382.90円	28カプセル(14×2) PTP	日本ベーリンガーインゲルハイム	ニンテダニブエタンシルホン酸塩	特発性肺線維症	通常、成人にはニンテダニブとして1回150mgを1日2回、朝・夕食後に経口投与する。なお、患者の状態によりニンテダニブとして1回100mgの1日2回投与へ減量する。	劇、処方	2015.7.3	新有効成分
			オフエブカプセル150mg	150mg1カプセル	6,574.40円	28カプセル(14×2) PTP							
3	429	内用薬	ファリーダックカプセル10mg	10mg1カプセル	36,583.90円	12カプセル(PTP)	ノバルティスファーマ	パノピノスタット乳酸塩	再発又は難治性の多発性骨髄腫	ボルテゾミブ及びデキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはパノピノスタットとして1日1回20mgを週3回、2週間(1, 3, 5, 8, 10及び12日目)経口投与した後、9日間休薬(13~21日目)。この3週間で1サイクルとし、投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量。	劇、処方	2015.7.3	新有効成分
			ファリーダックカプセル15mg	15mg1カプセル	54,875.80円	12カプセル(PTP)							
4	625	内用薬	ハーボニー配合錠	1錠	80,171.30円	28錠瓶	ギリアド・サイエンシズ	レジバスピル アセトン付加物/ソホスビル	セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	通常、成人には1日1回1錠(レジバスピルとして90mg及びソホスビルとして400mg)を12週間経口投与する。	処方	2015.7.3	新有効成分 新医療用配合剤
5	249	注射薬	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	3,102円	450単位/1.5mL×2本	サノフィ	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	インスリン療法が適応となる糖尿病	通常、成人では、初期は1日1回4~20単位を皮下注射するが、ときに他のインスリン製剤を併用することがある。注射時刻は毎日一定とする。投与量は、患者の症状及び検査所見に応じて増減する。なお、その他のインスリン製剤の投与量を含めた維持量は、通常1日4~80単位である。 ただし、必要により上記用量を超えて使用することがある。	劇、処方	2015.7.3	新剤型

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
6	249	注射薬	トルリシディ皮下注 0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL 1キット	3,586円	注射剤 0.75mg/0.5mL L: 2キット	日本イーライ リリー	デュラグル チド (遺伝 子組換え)	2型糖尿病	通常、成人には、デュラグルチド (遺伝子組換え) として、0.75mgを週に1回、皮下注射する。	生物、 劇、処方	2015.7.3	新有効成分
7	290	注射薬	ザイヤフレックス注射用 (溶解液付)	0.58mg1瓶 (溶解液付)	193,861円	1バイアル (専 用溶解液添 付)	旭化成ファ ーマ	コラゲナー ゼ (クロ ストリジ ウムヒス トリチク ム)	デュビユイトラン拘縮	通常、成人には、コラゲナーゼ (クロストリジウム ヒストリチウム) として0.58mgを中手指関節関節又は近位指節間関節の拘縮索に注射する。効果が不十分な場合、投与した拘縮索に対する追加投与は1ヵ月間の間隔をあげ、最大3回までとすること。	劇、処方	2015.7.3	新有効成分
8	395	注射薬	ストレンジック皮下注 12mg/0.3mL	12mg0.3mL 1瓶	131,859円	1バイアル	アレクシオン ファーマ	アスホター ゼ アル ファ (遺 伝子組 換え)	低ホスファターゼ症	通常、アスホターゼ アルファ (遺伝子組換え) として、1回1mg/kgを週6回、又は1回2mg/kgを週3回皮下投与する。なお、患者の状態に応じて、適宜減量する。	生物、 劇、処方	2015.7.3	新有効成分
			ストレンジック皮下注 18mg/0.45mL	18mg0.45mL 1瓶	197,788円	1バイアル							
			ストレンジック皮下注 28mg/0.7mL	28mg0.7mL 1瓶	307,671円	1バイアル							
			ストレンジック皮下注 40mg/1mL	40mg1mL 1瓶	439,530円	1バイアル							
			ストレンジック皮下注 80mg/0.8mL	80mg0.8mL 1瓶	879,061円	1バイアル							
9	429	注射薬	ヤーボイ点滴静注液 50mg	50mg10mL1 瓶	485,342円	10mL1バイ アル	プリストル・ マイヤーズ	イビリムマ ブ (遺 伝子組 換え)	根治切除不能な悪性黒色腫	通常、成人にはイビリムマブ (遺伝子組換え) として1日1回3mg/kg (体重) を3週間間隔で4回点滴静注する。	生物、 劇、処方	2015.7.3	新有効成分
10	634	注射薬	アコアラン静注用600	600国際単位1 瓶 (溶解液 付)	32,999円	1バイアル (溶 解液 (日局注射 用水12mL)、 溶解液注入針添 付)	協和発酵キ リン	アンチトロ ンピン ガ ンマ (遺 伝子組 換え)	先天性アンチトロンピン欠 乏に基づく血栓形成傾向 アンチトロンピン低下を伴 う播種性血管内凝固症候群 (DIC)	本剤を添付の注射用水で溶解し、緩徐に静注もしくは点滴静注する。 1. 先天性アンチトロンピン欠乏に基づく血栓形成傾向 1日1回24~72国際単位/kgを投与する。 2. アンチトロンピン低下を伴う播種性血管内凝固症候群 (DIC) 通常、成人には、1日1回36国際単位/kgを投与する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日量として72国際単位/kgを超えないこと。	生物、処 方	2015.7.3	新有効成分

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。