

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	399	内用薬	ボンピバ錠100mg	100mg1錠	2,790.00円	患者さん用パッケージ付PTP3錠(1錠×3)	中外製薬	イバンドロン酸ナトリウム水和物	骨粗鬆症	通常、成人にはイバンドロン酸として100mgを1カ月に1回、起床時に十分量(約180mL)の水とともに経口投与する。なお、服用後少なくとも60分は横にならず、飲食(水を除く)及び他の薬剤の経口摂取を避けること。	劇、処方	2016.1.22	新投与経路
2	429	内用薬	タルグレチンカプセル75mg	75mg1カプセル	2,797.90円	14カプセル(14カプセル×1)(PTP)、100カプセル(ボトル)	ミノファージェン製薬	ベキサロテン	皮膚T細胞性リンパ腫	通常、成人にはベキサロテンとして1日1回300mg/m ² (体表面積)を食後経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2016.1.22	新有効成分
3	218	注射薬	レバサ皮下注140mgシリンジ	140mg1mL1筒	22,948円	シリンジ1本	アステラス・アムジェン・バイオファーマ	エボロクマブ(遺伝子組換え)	家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症 ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分な場合に限る。	家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症：通常、成人にはエボロクマブ(遺伝子組換え)として140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回皮下投与する。 家族性高コレステロール血症ホモ接合体：通常、成人にはエボロクマブ(遺伝子組換え)として420mgを4週間に1回皮下投与する。効果不十分な場合には420mgを2週間に1回皮下投与できる。なお、LDLアフェレーシスの補助として本剤を使用する場合は、開始用量として420mgを2週間に1回皮下投与することができる。	生物、処方	2016.1.22	新有効成分
			レバサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	22,948円	ペン1本							
4	634	注射薬	リクスビス静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	57,744円	500国際単位×1バイアル添付溶解液(日局注射用水5mL)	バクスアルタ	ノナコグカンマ(遺伝子組換え)	血液凝固第IX因子欠乏患者における出血傾向の抑制	本剤を添付の溶解液5mLで溶解し、静脈内に注射する。なお、10mL/分を超えない速度で注入すること。通常、1回体重1kg当たり50国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。定期的に投与する場合、通常、体重1kg当たり40～75国際単位を週2回投与し、12歳未満の小児に対しては体重1kg当たり40～80国際単位を週2回投与する。	生物、処方	2014.12.26	新有効成分
			リクスビス静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	114,279円	1000国際単位×1バイアル添付溶解液(日局注射用水5mL)							
			リクスビス静注用2000	2,000国際単位1瓶(溶解液付)	226,162円	2000国際単位×1バイアル添付溶解液(日局注射用水5mL)							
			リクスビス静注用3000	3,000国際単位1瓶(溶解液付)	337,159円	3000国際単位×1バイアル添付溶解液(日局注射用水5mL)							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	219	外用薬	ベンテイビス吸入液10μg	10μg1mL1管	2,386.50円	アンプル 1mL ×42	バイエル薬品	イロブロスト	肺動脈性肺高血圧症	通常、成人にはイロブロストとして初回は1回2.5μgをネブライザを用いて吸入し、忍容性を確認した上で2回目以降は1回5.0μgに増量して1日6～9回吸入する。1回5.0μgに忍容性がない場合には、1回2.5μgに減量する。	劇、処方	2015.9.28	新有効成分
6	629	外用薬	ルコナック爪外用液5%	5%1g	997.80円	3.5g (4mL) × 5、3.5g (4mL) ×10 (プラスチック 容器)	佐藤製薬	ルリコナ ゾール	<適応菌種> 皮膚糸状菌 (トリコフィトン属) <適応症> 爪白癬	1日1回罹患爪全体に塗布する。	処方	2016.1.22	新効能 新剤形
7	729	外用薬	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	100mg 1瓶	7,378.30円	1バイアル	三和化学研究所	メタコリン 塩化物	気道過敏性検査	メタコリン塩化物100 mg (1バイアル) に日局生理食塩液を加え溶解及び希釈し、通常0.039～25 mg/mLの範囲の適切な希釈系列の希釈液を調製する。成人及び小児ともに、調製した希釈系列を低濃度よりネブライザーを用いて吸入し、気道過敏性検査を実施する。	劇、処方	2016.1.22	新有効成分
			ケンブラン吸入粉末溶解用100mg	100mg 1瓶	7,378.30円	100mg×1瓶	参天製薬					2016.1.22	

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。