

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考	
1	249	内用薬	イスツリサ錠1mg	1mg1錠	3,335.90円	30錠 [10錠 (PTP) × 3]	レコルダ ティ・レア・ ディジーズ・ ジャパン	オシロドロ スタットリ ン酸塩	クッシング症候群（外科的処置で効果が不十分又は施行が困難な場合）	通常、成人にはオシロドロスタットとして1回1mgを1日2回経口投与から開始するが、開始用量は患者の状態に応じて適宜減量する。その後は、患者の状態に応じて適宜増減するが、最高用量は1回30mgを1日2回とする。	劇、処方	R3.3.23	新有効成分	
			イスツリサ錠5mg	5mg1錠	13,249.00円	30錠 [10錠 (PTP) × 3]								
2	429	内用薬	ヴァイトラックピカプセル25mg	25mg1カプセル	4,042.50円	56カプセル [プラスチックボトル、バラ]	バイエル薬品	ラロトレク チニブ	NTRK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	通常、成人にはラロトレクチニブとして1回100mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 通常、小児にはラロトレクチニブとして1回100mg/m ² （体表面積）を1日2回経口投与する。ただし、投与量は1回100mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R3.3.23	新有効成分	
			ヴァイトラックピカプセル100mg	100mg1カプセル	14,542.90円	28カプセル [プラスチックボトル、バラ]								
			ヴァイトラックピ内用液20mg/mL	2%1mL	2,908.60円	50mL [1瓶]								
3	429	内用薬	ベマジール錠4.5mg	4.5mg 1錠	25,631.20円	42錠 [14錠 (PTP) × 3]	インサイト・ バイオサイエ ンシズ・ジャ パン	ベミガチニ ブ	がん化学療法後に増悪したFGFR2 融合遺伝子陽性の治癒切除不能な胆道癌	通常、成人には、ベミガチニブとして1日1回13.5mgを14日間経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R3.3.23	新有効成分	
4	119	注射薬	ケシンブタ皮下注20mg ベン	20mg0.4mL1 キット	230,860円	1本	ノバルティス ファーマ	オフアツム マブ（遺伝 子組換え）	下記患者における再発予防及び身体的障害の進行抑制 再発寛解型多発性硬化症 疾患活動性を有する二次性進行型多発性硬化症	通常、成人には、オフアツムマブ（遺伝子組換え）として1回20mgを初回、1週後、2週後、4週後に皮下注射し、以降は4週間隔で皮下注射する。	生物、 劇、処方	R3.3.23	新投与経路、 新効能	

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	395	注射薬	イズカーゴ点滴静注用 10mg	10mg1瓶	251,030円	1バイアル	JCRファーマ	パピナフスブアルファ(遺伝子組換え)	ムコ多糖症Ⅱ型	通常、パピナフスブアルファ(遺伝子組換え)として、1回体重1kgあたり2.0mgを週1回、点滴静注する。	劇、処方	R3.3.23	新有効成分
6	399	注射薬	ジョイクル関節注30mg	30mg3mL1筒	4,394円	1シリンジ [3mL×1] 10シリンジ [3mL×10]	生化学工業	シクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム	変形性関節症(膝関節、股関節)	通常、成人1回1シリンジ(シクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムとして1回30mg)を4週間ごとに関節腔内に投与する。	処方	R3.3.23	新有効成分
7	429	注射薬	ポライビー点滴静注用 30mg	30mg1瓶	298,825円	1バイアル	中外製薬	ボラツスマブベドチン(遺伝子組換え)	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	ベンダムスチン塩酸塩及びリツキシマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人には、ボラツスマブベドチン(遺伝子組換え)として1回1.8mg/kg(体重)を3週間間隔で6回点滴静注する。初回投与時は90分かけて投与し、忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。なお、患者の状態に応じて適宜減量する。	生物、劇、処方	R3.3.23	新有効成分
			ポライビー点滴静注用 140mg	140mg1瓶	1,364,330円	1バイアル							
8	429	注射薬	レミトロ点滴静注用300µg	300µg1瓶	85,610円	1バイアル	エーザイ	デニロイキンジフチトクス(遺伝子組換え)	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫 再発又は難治性の皮膚T細胞性リンパ腫	通常、成人にはデニロイキンジフチトクス(遺伝子組換え)として1日1回9µg/kgを1時間かけて5日間点滴静注した後、16日間休薬する。この21日間を1サイクルとして、最大8サイクル投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R3.3.23	新有効成分
9	429	注射薬	ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶	434,209円	15mL [1バイアル]	ヤンセンファーマ	ダラツスマブ(遺伝子組換え)/ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)	多発性骨髄腫	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人には本剤1回15mL(ダラツスマブ(遺伝子組換え)として1回1,800mg及びボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)として30,000単位(2,000単位/mL))を、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法又はB法の投与間隔で皮下投与する。 A法：1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。 B法：1週間間隔、3週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。	生物、劇、処方	R3.3.23	新有効成分、新医療用配合剤

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
10	634	注射薬	ヌーイック静注用250	250国際単位1瓶 (溶解液付)	22,543円	ヌーイック静注用250×1 バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き	藤本製薬	シモクトコ グアル ファ(遺伝 子組換え)	血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出 血傾向の抑制	本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈内投与する。1分間に4mLを超える注 射速度は避けること。 通常、1回体重1kg当たり10～30国際単位を投与するが、患者の症状に応じて適宜増 減する。 定期的に投与する場合、12歳以上の患者には、通常、1回体重1kg当たり30～40国際 単位を週3回又は隔日投与する。患者の状態に応じ、投与量は1回体重1kg 当たり65 国際単位を超えない範囲で、投与間隔は3～5日の範囲で適宜調節することもできる。 12歳未満の患者には、通常、1回体重1kg当たり30～50国際単位を週3回又は隔日投 与する。	生物、処 方	R3.1.22	新有効成分
			ヌーイック静注用500	500国際単位1瓶 (溶解液付)	41,865円	ヌーイック静注用500×1 バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き							
			ヌーイック静注用1000	1000国際単位1 瓶(溶解液付)	77,750円	ヌーイック静注用1000× 1バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き							
			ヌーイック静注用2000	2000国際単位1 瓶(溶解液付)	144,395円	ヌーイック静注用2000× 1バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き							
			ヌーイック静注用2500	2500国際単位1 瓶(溶解液付)	176,239円	ヌーイック静注用2500× 1バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き							
			ヌーイック静注用3000	3000国際単位1 瓶(溶解液付)	207,405円	ヌーイック静注用3000× 1バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き							
			ヌーイック静注用4000	4000国際単位1 瓶(溶解液付)	268,164円	ヌーイック静注用4000× 1バイアル 添付溶解液プレフィルド シリンジ 「日本薬局方 注射用水 2.5mL」×1シリンジ付き							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
11	639	注射薬	ユプリズナ点滴静注 100mg	100mg10mL1瓶	3,495,304円	10mL (バイアル) ×3	田辺三菱製薬	イネピリズマブ (遺伝子組換え)	視神経脊髄炎スペクトラム障害 (視神経脊髄炎を含む) の再発予防	通常、成人には、イネピリズマブ (遺伝子組換え) として1回300mgを初回、2週後に点滴静注し、その後、初回投与から6カ月後に、以降6カ月に1回の間隔で点滴静注する。	生物、劇、処方	R3.3.23	新有効成分
12	114	外用薬	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	156.50円	140枚 (1枚/1袋×140袋)	久光製薬	ジクロフェナクナトリウム	各種がんにおける鎮痛	通常、成人に対し、1日1回、2枚 (ジクロフェナクナトリウムとして150mg) を胸部、腹部、上腕部、背部、腰部又は大腿部に貼付し、1日 (約24時間) 毎に貼り替える。なお、症状や状態により1日3枚 (ジクロフェナクナトリウムとして225mg) に増量できる。	処方	R3.3.23	新効能、新剤形
13	616	外用薬	アリケイス吸入液 590mg	590mg8.4mL1瓶	42,408.40円	7バイアル	インスメッド	アミカシン硫酸塩	適応菌種：アミカシンに感性的マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC) 適応症：マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症	通常、成人にはアミカシンとして590mg (力価) を1日1回ネブライザを用いて吸入投与する。	処方	R3.3.23	新投与経路
14	490		ブレヤンジ静注	1患者当たり	32,647,761円	-	セルジーン	リソカプタゲン マラルユーセル	以下の再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫 ・びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、 原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、 形質転換低悪性度非ホジキンリンパ腫、 高悪性度B細胞リンパ腫 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	通常、成人には、CAR発現生T細胞としてCD8陽性細胞 (20×10 ⁶ ~50×10 ⁶ 個) 及びCD4陽性細胞 (20×10 ⁶ ~50×10 ⁶ 個) を、合計細胞数が体重を問わず100×10 ⁶ 個を目標 (範囲：44×10 ⁶ ~100×10 ⁶ 個) に、CD8陽性細胞及びCD4陽性細胞の細胞数の比が1 (範囲：0.8~1.2) となるよう、CD8陽性細胞を静脈内投与した後にCD4陽性細胞を静脈内投与する。なお、本品の再投与はしないこと。		R3.3.22	新再生医療等製品

・薬価については官報をご確認下さい。

・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。

・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。

・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。

・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。