

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考																																	
1	259	内用薬	バイアグラ錠25mg	25mg1錠	959.60円	20錠 [10錠 (PTP) ×2]	ヴィアトリス	シルデナフィ ルクエン酸塩	勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者）	通常、成人には1日1回シルデナフィルとして25mg～50mgを性行為の約1時間前に経口投与する。 高齢者（65歳以上）、肝障害のある患者及び重度の腎障害（Ccr<30mL/min）のある患者については、本剤の血漿中濃度が増加することが認められているので、25mgを開始用量とすること。 1日の投与は1回とし、投与間隔は24時間以上とすること。	処方	H11.1.25	新有効成分																																	
			バイアグラ錠50mg	50mg1錠	1,380.00円	20錠 [10錠 (PTP) ×2] 100錠 [10錠 (PTP) ×10]																																								
			バイアグラODフィルム 25mg	25mg1錠	991.60円	20枚 [10枚×2]																																								
			バイアグラODフィルム 50mg	50mg1錠	1424.10円	20枚 [10枚×2] 50枚 [10枚×5]																																								
2	259	内用薬	シアリス錠5mg	5mg1錠	1,343.80円	20錠 [10錠 (PTP) ×2]	日本新薬	タダラフィル	勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起とその維持が出来ない患者）	通常、成人には1日1回タダラフィルとして10mgを性行為の約1時間前に経口投与する。 10mgの投与で十分な効果が得られず、忍容性が良好と判断された器質性又は混合型勃起不全患者に対しては、20mgに増量することができる。軽度又は中等度の肝障害のある患者では10mgを超えないこと。なお、いずれの場合も1日の投与は1回とし、投与間隔は24時間以上とすること。中等度又は重度の腎障害のある患者では、5mgから開始し、投与間隔は24時間以上とすること。なお、中等度の腎障害のある患者では最高用量は10mgを超えないこととし、10mgを投与する場合には投与間隔を48時間以上とすること。重度の腎障害のある患者では5mgを超えないこと。	処方	H19.7.31	新有効成分																																	
			シアリス錠10mg	10mg1錠	1,454.60円	20錠 [10錠 (PTP) ×2] 40錠 [10錠 (PTP) ×4]																																								
			シアリス錠20mg	20mg1錠	1,529.90円	20錠 [10錠 (PTP) ×2] 40錠 [10錠 (PTP) ×4]																																								
3	241	注射薬	レコベル皮下注12μgペン キット	12μg0.36mL1 キット	10,992円	1本/箱	フェリング・ ファーマ	ホルトリロピン デルタ (遺伝子組換え)	生殖補助医療における調節卵巣刺激	通常、ホルトリロピン デルタ（遺伝子組換え）として、投与開始前の血清抗ミュラー管ホルモン（AMH）値及び体重に基づき、下表に従い算出した投与量を、月経周期2日目又は3日目から1日1回皮下投与し、卵胞が十分に発育するまで継続する。なお、下表に従い算出した投与量が6μgを上回る場合は6μgを、12μgを上回る場合は12μgを、1日あたりの投与量とする。	生物、処方	R3.3.23	新有効成分																																	
			レコベル皮下注36μgペン キット	36μg1.08mL1 キット	26,293円	1本/箱																																								
			レコベル皮下注72μgペン キット	72μg2.16mL1 キット	45,582円	1本/箱																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>血清 AMH 値 (pmol/L)</th> <th>< 15</th> <th>15 ～ 16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>21</th> <th>23</th> <th>25</th> <th>28</th> <th>33</th> <th>≥ 40</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日 あたりの 投与量 μg</td> <td>12</td> <td>0.19</td> <td>0.18</td> <td>0.17</td> <td>0.16</td> <td>0.15</td> <td>0.14</td> <td>0.13</td> <td>0.12</td> <td>0.11</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="11" style="text-align: center;">μg/kg (体重)</td> </tr> </tbody> </table>											血清 AMH 値 (pmol/L)	< 15	15 ～ 16	17	18	19	21	23	25	28	33	≥ 40	1日 あたりの 投与量 μg	12	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10		μg/kg (体重)										
血清 AMH 値 (pmol/L)	< 15	15 ～ 16	17	18	19	21	23	25	28	33	≥ 40																																			
1日 あたりの 投与量 μg	12	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10																																			
	μg/kg (体重)																																													
4	249	注射薬	ガニレスト皮下注0.25mg シリンジ	0.25mg0.5mL1筒	8,904円	1シリンジ (0.5mL)	オルガン	ガニレリクス 酢酸塩	調節卵巣刺激下における早発排卵の防止	原則として卵巣刺激ホルモン製剤投与の6日目から開始し、ガニレリクスとして0.25mgを1日1回皮下に連日投与する。	劇、処方	H20.7.16	新有効成分																																	
5	249	注射薬	セトロライド注射用 0.25mg	0.25mg1瓶(溶解 液付)	9,057円	1バイアル (日局注射用水 1mL [1アンプル] 添付)	日本化薬	セトロレリク ス酢酸塩	調節卵巣刺激下における早発排卵の防止	卵巣刺激開始6日目から排卵誘発日まで、セトロレリクスとして0.25mgを1日1回腹部皮下に連日投与する。	劇、処方	H18.4.20	新有効成分																																	
6	247	外用薬	ルテウム腔用坐剤400mg	400mg1個	541.90円	28個 [4個 (プラスチック製 コンテナ) ×7]	あすか製薬	プロゲステロ ン	生殖補助医療における黄体補充	プロゲステロンとして1回400mgを1日2回、採卵日（又はホルモン補充周期下での凍結胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点）から最長10週間（又は妊娠12週まで）腔内に投与する。	処方	H28.3.28	新投与経路																																	
7	247	外用薬	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	200mg1カプセル	361.30円	24カプセル [6カプセル (PTP) ×4]	富士製薬工業	プロゲステロ ン	生殖補助医療における黄体補充	プロゲステロンとして1回200mgを1日3回、胚移植2～7日前より経腔投与する。妊娠が確認できた場合は、胚移植後9週（妊娠11週）まで投与を継続する。	処方	H28.1.22	新投与経路																																	

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
8	247	外用薬	ルティナス錠100mg	100mg1錠	361.30円	21錠 [3錠×7: プリスター、ポリエチレン製専用アプリケータ21本 (1錠につき1本) 添付]	フェリング・ファーマ	プロゲステロン	生殖補助医療における黄体補充	プロゲステロンとして1回100mgを1日2回又は3回、採卵日 (又はホルモン補充周期下での凍結胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点) から最長10週間 (又は妊娠12週まで) 腔内に投与する。	処方	H26.9.26	新投与経路
9	247	外用薬	フンクリノン腔用ゲル90mg	90mg1管	1,083.80円	ポリエチレン製アプリケータ×7本	メルクバイオファーマ	プロゲステロン	生殖補助医療における黄体補充	プロゲステロンとして1回90mgを1日1回、採卵日 (又はホルモン補充周期下での凍結胚移植ではエストロゲン投与により子宮内膜が十分な厚さになった時点) から最長10週間 (又は妊娠12週まで) 腔内に投与する。	処方	H28.7.4	新投与経路

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。