

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	625	内用薬	ポカブリア錠30mg	30mg1錠	3,541.60	30錠 [瓶、バラ]	ヴィーベルスケア	カボテグラビルナトリウム	HIV-1感染症	リルピビリン塩酸塩との併用において、通常、成人には1回1錠（カボテグラビルとして30mg）を1日1回経口投与する。	処方	R4.5.31	新有効成分
2	625	注射薬	ポカブリア水懸筋注 400mg	400mg2mL1 瓶	176,458	2mL [1バイアル]	ヴィーベルスケア	カボテグラビル	HIV-1感染症	<p>（1か月間隔投与）</p> <p>リルピビリンとの併用において、通常、成人にはカボテグラビルとして600mgを臀部筋肉内に投与する。以降は、400mgを1か月に1回、臀部筋肉内に投与する。</p> <p>（2か月間隔投与）</p> <p>リルピビリンとの併用において、通常、成人にはカボテグラビルとして600mgを臀部筋肉内に投与する。本剤初回投与1か月後に600mgを臀部筋肉内に投与し、以降は600mgを2か月に1回、臀部筋肉内に投与する。</p>	処方	R4.5.31	新有効成分
			ポカブリア水懸筋注 600mg	600mg3mL1 瓶	253,850	3mL [1バイアル]							
3	625	注射薬	リカムビス水懸筋注 600mg	600mg2mL1 瓶	90,582	2mL [1バイアル]	ヤンセンファーマ	リルピビリン	HIV-1感染症	<p>（1か月間隔投与）</p> <p>カボテグラビルとの併用において、通常、成人にはリルピビリンとして900mgを臀部筋肉内に投与する。以降は600mgを1か月に1回、臀部筋肉内に投与する。</p> <p>（2か月間隔投与）</p> <p>カボテグラビルとの併用において、通常、成人にはリルピビリンとして900mgを臀部筋肉内に投与する。本剤初回投与1か月後に900mgを臀部筋肉内に投与し、以降は900mgを2か月に1回、臀部筋肉内に投与する。</p>	劇、処方	R4.5.31	新有効成分
			リカムビス水懸筋注 900mg	900mg3mL1 瓶	130,310	3mL [1バイアル]							

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。