

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	113	内用薬	サブリンル散分包500mg	500mg1包	1,487.00円	60包	サノフィ	ピガバトリン	點頭てんかん	通常、生後4週以上の患者には、ピガバトリンとして1日50 mg/kgから投与を開始する。患者の症状に応じて、3日以上の間隔をあけて1日投与量として50 mg/kgを超えない範囲で漸増するが、1日最大投与量は150 mg/kg又は3gのいずれか低い方を超えないこととし、いずれも1日2回に分け、用時溶解して経口投与する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
2	113	内用薬	フィコンバ錠2mg	2mg1錠	189.70円	56錠 (PTP14T×4)、500錠 (バラ)	エーザイ	ベランパネル水和物	他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法部分発作 (二次性全般化発作を含む) 強直間代発作	通常、成人及び12歳以上の小児にはベランパネルとして1日1回2 mgの就寝前経口投与より開始し、その後1週間以上の間隔をあけて2 mgずつ漸増する。本剤の代謝を促進する抗てんかん薬を併用しない場合の維持用量は1日1回8 mg、併用する場合の維持用量は1日1回8~12 mgとする。なお、症状により1週間以上の間隔をあけて2 mgずつ適宜増減するが、1日最高12 mgまでとする。	処方	2016.3.28	新有効成分
			フィコンバ錠4mg	4mg1錠	310.20円	56錠 (PTP14T×4)、500錠 (バラ)							
3	117	内用薬	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠	274.00円	ブリスター包装100錠 (10錠×10シート)、300錠 (10錠×30シート)	Meiji Seikaファルマ	アセナピンマレイン酸塩	統合失調症	通常、成人にはアセナピンとして1回5mgを1日2回舌下投与から投与を開始する。なお、維持用量は1回5 mgを1日2回、最高用量は1回10 mgを1日2回までとするが、年齢、症状に応じ適宜増減すること。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
			シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠	411.00円	ブリスター包装100錠 (10錠×10シート)、300錠 (10錠×30シート)							
4	429	内用薬	イムブルピカカプセル140mg	140mg1カプセル	9,367.00円	14カプセル (14カプセル×1)	ヤンセンファーマ	イフルチニブ	再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む)	通常、成人にはイフルチニブとして420mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	429	内用薬	シカディアカプセル150mg	150mg1カプセル	6,297.00円	14カプセル (PTP)	ノバルティスファーマ	セリチニブ	クリソチニブに抵抗性又は不耐容の ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはセリチニブとして750mgを1日1回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
6	429	内用薬	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	12,482.50円	(PTP)28錠 (7錠×4)	アストラゼネカ	オシメルチニブメシル酸塩	EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性の手術不能又は再発非小細胞肺癌	通常、成人にはオシメルチニブとして80mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
			タグリッソ錠80mg	80mg1錠	23,932.60円	(PTP)14錠 (7錠×2)							
7	429	内用薬	タフィンラーカプセル50mg	50mg1カプセル	4,860.60円	28カプセル (プラスチックボトル)	ノバルティスファーマ	ダブラフェニブメシル酸塩	BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫	通常、成人にはダブラフェニブとして1回150mgを1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
			タフィンラーカプセル75mg	75mg1カプセル	7,156.50円	28カプセル (プラスチックボトル)							
8	429	内用薬	メキニスト錠0.5mg	0.5mg1錠	7,731.70円	7錠 (プラスチックボトル)	ノバルティスファーマ	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物	BRAF 遺伝子変異を有する根治切除不能な悪性黒色腫	ダブラフェニブとの併用において、通常、成人にはトラメチニブとして2mgを1日1回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
			メキニスト錠2mg	2mg1錠	29,021.00円	7錠 (プラスチックボトル)							
9	641	内用薬	プリマキン錠15mg「サノフィ」	15mg1錠	2,211.80円	(プラスチックボトル) 14錠	サノフィ	プリマキンリン酸塩	三日熱マラリア及び卵形マラリア	通常、成人にはプリマキンとして30mgを1日1回14日間、食後に経口投与する。 通常、小児にはプリマキンとして0.5mg/kg (最大30mg) を1日1回14日間、食後に経口投与する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
10	641	内用薬	マラロン小児用配合錠	1錠	161.50円	100錠(瓶)	グラクソ・スミスクライン	アトバコン/プログアニル塩酸塩	マラリア	<p>治療：</p> <p>成人 通常、1日1回アトバコン/プログアニル塩酸塩として1000mg/400mgを3日間、食後に経口投与する。</p> <p>小児 通常、体重に応じアトバコン/プログアニル塩酸塩として下記の投与量を1日1回3日間、食後に経口投与する。</p> <p>5～8kg：125mg/50mg 9～10kg：187.5mg/75mg 11～20kg：250mg/100mg 21～30kg：500mg/200mg 31～40kg：750mg/300mg >40kg：1000mg/400mg</p> <p>(注：以下、予防投与は保険適用外です)</p> <p>予防：</p> <p>成人 通常、1日1回アトバコン/プログアニル塩酸塩として250mg/100mgを、マラリア流行地域到着24～48時間前より開始し、流行地域滞在中及び流行地域を離れた後7日間、毎日食後に経口投与する。</p> <p>小児 通常、体重に応じアトバコン/プログアニル塩酸塩として下記の投与量を1日1回、マラリア流行地域到着24～48時間前より開始し、流行地域滞在中及び流行地域を離れた後7日間、毎日食後に経口投与する。</p> <p>11～20kg：62.5mg/25mg 21～30kg：125mg/50mg 31～40kg：187.5mg/75mg >40kg：250mg/100mg</p>	劇、処方	2016.3.28	新用量 剤形追加
11	229	注射薬	ヌーカラ皮下注用100mg	100mg1瓶	175,684円	1バイアル	グラクソ・スミスクライン	メボリズマブ(遺伝子組換え)	気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)	通常、成人及び12歳以上の小児にはメボリズマブ(遺伝子組換え)として1回100mgを4週間ごとに皮下に注射する。	生、劇、 処方	2016.3.28	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
12	395	注射薬	カヌマ点滴静注液20mg	20mg10mL1瓶	1,277,853円	1バイアル10mL	アレクシオンファーマ	セベリパーゼ アルファ (遺伝子組換え)	ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症 (コレステロールエステル蓄積症、ウォルマン病)	通常、セベリパーゼ アルファ (遺伝子組換え) として、1 回体重1 kg あたり1 mg を2 週に1 回、点滴静注する。効果不十分な場合には、1 回体重1 kg あたり3 mg を2 週に1 回又は週1 回まで増量し、点滴静注する。ただし、乳児期発症の急速進行性の場合には、セベリパーゼ アルファ (遺伝子組換え) として、1 回体重1 kg あたり1 mg を週1 回、点滴静注する。効果不十分な場合には、1 回体重1 kg あたり3 mg を週1 回まで増量し、点滴静注する。なお、患者の状態に応じて適宜増減する。	特生、劇、処方	2016.3.28	新有効成分
13	429	注射薬	ソーフィゴ静注	1回分	684,930円	6,160kBq 1バイアル	パイエル薬品	塩化ラジウム (^{223}Ra)	骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌	通常、成人には、1回55kBq/kgを4週間間隔で最大6回まで、緩徐に静脈内投与する。	劇、処方	2016.3.28	新有効成分
14	634	注射薬	アディノバイト静注用500	500国際単位1瓶 (溶解液付)	59,372円	500国際単位×1バイアル	バクスアルタ	ルリオクトコグ アルファ ベゴル (遺伝子組換え)	血液凝固第VIII 因子欠乏患者における出血傾向の抑制	本剤を添付の溶解液5mL で溶解し、緩徐に静脈内に注射する。なお、10mL/分を超えない速度で注入すること。通常、成人及び12 歳以上の小児には、1 回体重1kg 当たり10~30 国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。定期的に投与する場合、通常、成人及び12 歳以上の小児には、1 回体重1kg 当たり40~50 国際単位を週2 回投与するが、患者の状態に応じて1回体重1kg 当たり60国際単位に増量できる。	生、処方	2016.3.28	新有効成分
			アディノバイト静注用1000	1,000国際単位1瓶 (溶解液付)	110,104円	1000国際単位×1バイアル							
			アディノバイト静注用2000	2,000国際単位1瓶 (溶解液付)	204,184円	2000国際単位×1バイアル							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
15	634	注射薬	コバールトリー静注用 250	250国際単位1 瓶(溶解液 付)	26,680円	250国際単位×1 バイアル[添付 溶解液プレフィ ルドシリンジ (日本薬局方 注射用水2.5m L)×1シリンジ 付き]	バイエル薬品	オクトコグ ベータ(遺 伝子組換 え)	血液凝固第VIII因子欠乏 患者における出血傾向の抑 制	本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈 内注射する。なお、1分間に5mLを超える注 射速度は避けること。通常、1回体重1kg 当 たり10～30 国際単位を投与するが、患者の状 態に応じて適宜増減する。 定期的に投与する場合、通常、体重1kg 当 たり20～40 国際単位を週2 回又は週3 回投与 し、12 歳以下の小児に対しては、体重1kg 当 たり25～50国際単位を週2 回、週3 回又は隔 日投与する。	生、処方	2016.3.28	新有効成分
			コバールトリー静注用 500	500国際単位1 瓶(溶解液 付)	49,477円	500国際単位×1 バイアル[添付 溶解液プレフィ ルドシリンジ (日本薬局方 注射用水2.5m L)×1シリンジ 付き]							
			コバールトリー静注用 1000	1,000国際単 位1瓶(溶解 液付)	91,753円	1000国際単位× 1バイアル[添付 溶解液プレフィ ルドシリンジ (日本薬局方 注射用水2.5m L)×1シリンジ 付き]							
			コバールトリー静注用 2000	2,000国際単 位1瓶(溶解 液付)	170,154円	2000国際単位× 1バイアル[添付 溶解液プレフィ ルドシリンジ (日本薬局方 注射用水2.5m L)×1シリンジ 付き]							
			コバールトリー静注用 3000	3,000国際単 位1瓶(溶解 液付)	244,197円	3000国際単位× 1バイアル[添付 溶解液プレフィ ルドシリンジ (日本薬局方 注射用水2.5m L)×1シリンジ 付き]							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
16	269	外用薬	マーデュオックス軟膏	1g	231.00円	チューブ：10g ×1本、10g× 10本	中外製薬	マキサカル シトール/ ベタメタゾ ン酪酸エス テルプロビ オン酸エス テル	尋常性乾癬	通常、1日1回、適量を患部に塗布する。	劇、処方	2016.3.28	新医療用配合剤

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。