

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	117	内用薬	ピプレソン徐放錠50mg	50mg1錠	71.00円	100錠 (10錠×10)、100錠 (バラ)	アステラス製薬	クエチアピンフマル酸塩	双極性障害におけるうつ症状の改善	通常、成人にはクエチアピンとして1回50mgより投与を開始し、2日以上の間隔をあけて1回150mgへ増量する。その後、さらに2日以上の間隔をあけて、推奨用量である1回300mgに増量する。なお、いずれも1日1回就寝前とし、食後2時間以上あけて経口投与すること。	劇、処方	H29.7.3	新効能、新剤形
			ピプレソン徐放錠150mg	150mg1錠	188.60円	100錠 (10錠×10)、100錠 (バラ)							
2	396	内用薬	カナリア配合錠	1錠	300.30円	100錠 (10錠×10)	田辺三菱製薬	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物/カナグリフロジン水和物	2型糖尿病 ただし、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物及びカナグリフロジン水和物の併用による治療が適切と判断される場合に限る。	通常、成人には1日1回1錠 (テネリグリブチン/カナグリフロジン) を朝食前又は朝食後に経口投与する。	処方	H29.7.3	新医療用配合剤
3	399	内用薬	オルミエント錠2mg	2mg1錠	2,694.60円	30錠PTP (5錠×6)	日本イーライリリー	バリシチニブ	既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む)	通常、成人にはバリシチニブとして4mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態に応じて2mgに減量すること。	劇、処方	H29.7.3	新有効成分
			オルミエント錠4mg	4mg1錠	5,223.00円	30錠PTP (5錠×6)							
4	625	内用薬	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	1,469.70円	PTP : 14錠(14錠×1)	マルホ	アメナメビル	帯状疱疹	通常、成人にはアメナメビルとして1回400mgを1日1回食後に経口投与する。	処方	H29.7.3	新有効成分
5	119	注射薬	スピラザ髄注12mg	12mg5mL1瓶	9,320,424円	1バイアル/箱	バイオジェン・ジャパン	ヌシネルセンナトリウム	乳児型脊髄性筋萎縮症	通常、ヌシネルセンとして、1回につき下表の用量を投与する。初回投与後、2週、4週及び9週に投与し、以降4カ月の間隔で投与を行うこととし、いずれの場合も1～3分かけて髄腔内投与すること。  各投与時の日齢      用量      投与液量 0～90日齢            9.6mg      4mL 91～180日齢        10.3mg     4.3mL 181～365日齢       10.8mg     4.5mL 366～730日齢       11.3mg     4.7mL 731日齢～            12mg       5mL	処方	H29.7.3	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
6	422	注射薬	ジフォルタ注射液20mg	20mg1mL1瓶	89,632円	1バイアル	ムンディ ファーマ	プラトレ キサート	再発又は難治性の末梢性T 細胞リンパ腫	通常、成人には、プラトレキサートとして、1日1 回30mg/m <sup>2</sup> （体表面積）を3～5分間かけて、週1 回、静脈内投与する。これを6週連続で行い、7週目 は休薬する。これを1サイクルとして、投与を繰り返 す。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	H29.7.3	新有効成分
7	634	注射薬	ケイセントラ静注用500	500国際単位1 瓶（溶解液付）	35,004円	1バイアル （日局注射用水 20mL×1バイ アル、薬液用両 刃針添付）	CSLベーリン グ	乾燥濃縮人 プロトロン ピン複合体	ピタミンK拮抗薬投与中の 患者における、急性重篤 出血時、又は重大な出血 が予想される緊急を要す る手術・処置の施行時の 出血傾向の抑制	通常、血液凝固第IX因子として、下記の投与量を単 回静脈内投与する。	特定生 物、処方	H29.3.30	新有効成分
			ケイセントラ静注用1000	1,000国際単位 1瓶（溶解液 付）	65,225円	1バイアル （日局注射用水 40mL×1バイ アル、薬液用両 刃針添付）							

投与前のプロトロン ピン時間-国際 標準比（PT-INR）	投与量	
	体重100kg以下 の場合	体重100kgを超える 場合
2～<4	25IU/kg	2500IU
4～6	35IU/kg	3500IU
>6	50IU/kg	5000IU

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますので参照下さい。
- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。