

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	235	内用薬	モビコール配合内用剤	6.8523g1包	83.90円	100包	E A ファーマ	マクロゴール4000/塩化ナトリウム/炭酸水素ナトリウム/塩化カリウム	慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）	本剤は、水で溶解して経口投与する。 通常、2歳以上7歳未満の幼児には初回用量として1回1包を1日1回経口投与する。以降、症状に応じて適宜増減し、1日1～3回経口投与、最大投与量は1日量として4包まで（1回量として2包まで）とする。ただし、増量は2日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1日量として1包までとする。 通常、7歳以上12歳未満の小児には初回用量として1回2包を1日1回経口投与する。以降、症状に応じて適宜増減し、1日1～3回経口投与、最大投与量は1日量として4包まで（1回量として2包まで）とする。ただし、増量は2日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1日量として1包までとする。 通常、成人及び12歳以上の小児には初回用量として1回2包を1日1回経口投与する。以降、症状に応じて適宜増減し、1日1～3回経口投与、最大投与量は1日量として6包まで（1回量として4包まで）とする。ただし、増量は2日以上の間隔をあけて行い、増量幅は1日量として2包までとする。	処方	H30.9.21	新医療用配合剤
2	259	内用薬	ベオーバ錠50mg	50mg1錠	185.70円	100錠（10錠×10）、 140錠（14錠×10）	杏林製薬	ビベグロン	過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁	通常、成人にはビベグロンとして50mgを1日1回食後に経口投与する。	処方	H30.9.21	新有効成分
3	396	内用薬	トラディアンス配合錠AP	1錠	283.30円	100錠（10錠×10） PTP	日本ベーリンガーインゲルハイム	エンバグリフロジン/リナグリプチン	2型糖尿病 ただし、エンバグリフロジン及びリナグリプチンの併用による治療が適切と判断される場合に限る。	通常、成人には1日1回1錠（エンバグリフロジン/リナグリプチンとして10mg/5mg又は25mg/5mg）を朝食前又は朝食後に経口投与する。	処方	H30.9.21	新医療用配合剤
			トラディアンス配合錠BP	1錠	395.60円	100錠（10錠×10） PTP							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
4	396	内用薬	メトアナ配合錠LD	1錠	62.20円	100錠 (PTP10錠×10)、140錠 (PTP14錠×10)、500錠 (PTP10錠×50、バラ)	三和化学研究所	アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩	2型糖尿病 ただし、アナグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る。	通常、成人には1回1錠 (アナグリプチン/メトホルミン塩酸塩として100mg/250mg又は100mg/500mg) を1日2回朝夕に経口投与する。	処方	H30.9.21	新医療用配合剤
			メトアナ配合錠HD	1錠	62.20円	100錠 (PTP10錠×10)、140錠 (PTP14錠×10)、500錠 (PTP10錠×50、バラ)							
5	429	内用薬	ソスパタ錠40mg	40mg1錠	19,409.10円	42錠 (21錠×2)	アステラス製薬	ギルテリチニブ fumarate 塩酸塩	再発又は難治性のFLT3遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病	通常、成人にはギルテリチニブとして120mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日1回200mgを超えないこと。	劇、処方	H30.9.21	新有効成分
6	429	内用薬	ページニオ錠50mg	50mg1錠	3,258.70円	30錠 [10錠 (PTP) ×3]	日本イーライリリー	アバマシクリブ	ホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌	内分泌療法剤との併用において、通常、成人にはアバマシクリブとして1回150mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	H30.9.21	新有効成分
			ページニオ錠100mg	100mg1錠	5,949.20円	30錠 [10錠 (PTP) ×3]							
			ページニオ錠150mg	150mg1錠	8,460.10円	30錠 [10錠 (PTP) ×3]							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
7	429	内用薬	ロープレナ錠25mg	25mg1錠	7,216.40円	40錠 (10錠×4PTP)	ファイザー	ロルラチニブ	ALKチロシンキナーゼ阻害剤に抵抗性又は不耐容のALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはロルラチニブとして1日1回100mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	H30.9.21	新有効成分
			ロープレナ錠100mg	100mg1錠	25,961.00円	10錠 (10錠×1PTP)							
8	113	注射薬	ロラゼパム注2mg	2mg1mL1瓶	2,225円	2バイアル	ファイザー	ロラゼパム	てんかん重積状態	通常、成人にはロラゼパムとして4mgを静脈内投与する。投与速度は2mg/分を目安として緩徐に投与すること。なお、必要に応じて4mgを追加投与するが、初回投与と追加投与の総量として8mgを超えないこと。 通常、生後3か月以上の小児にはロラゼパムとして0.05mg/kg (最大4mg) を静脈内投与する。投与速度は2mg/分を目安として緩徐に投与すること。なお、必要に応じて0.05mg/kgを追加投与するが、初回投与と追加投与の総量として0.1mg/kgを超えないこと。	処方、向精神	H30.9.21	新投与経路
9	429	注射薬	ビーリンサイト点滴静注用35µg	35µg1瓶 (輸液安定化液付)	281,345円	1バイアル (輸液安定化液10mL 1バイアル添付)	アステラス・アムジェン・バイオファーマ	プリナツモマブ (遺伝子組換え)	再発又は難治性のB細胞性急性リンパ性白血病	通常、プリナツモマブ (遺伝子組換え) として以下の投与量を28日間持続点滴静注した後、14日間休薬する。これを1サイクルとし、最大5サイクル繰り返す。その後、プリナツモマブ (遺伝子組換え) として以下の投与量を28日間持続点滴静注した後、56日間休薬する。これを1サイクルとし、最大4サイクル繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。 ○ 体重が45kg以上の場合：1サイクル目の1～7日目は1日9µg、それ以降は1日28µg とする。 ○ 体重が45kg未満の場合：1サイクル目の1～7日目は1日5µg/m ² (体表面積)、それ以降は1日15µg/m ² (体表面積) とする。ただし、体重が45kg以上の場合の投与量を超えないこと。	劇、生物、処方	H30.9.21	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
10	449	注射薬	フィラジル皮下注30mgシリンジ	30mg3mL1筒	301,704円	3.0mL×1シリンジ、3.0mL×3シリンジ	シャイアー・ジャパン	イカチバント酢酸塩	遺伝性血管性浮腫の急性発作	通常、成人にはイカチバントとして1回30mgを皮下注射する。効果が不十分な場合又は症状が再発した場合は、6時間以上の間隔を置いて1回30mgを追加投与することができる。ただし、24時間あたりの投与回数は3回までとする。	処方	H30.9.21	新有効成分
11	634	注射薬	ジビイ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	75,376円	500国際単位×1バイアル(添付溶解液プレフィルドシリンジ(日本薬局方注射用水2.5mL)×1シリンジ付き)	バイエル薬品	ダモクトコグアルファペゴル(遺伝子組換え)	血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制	本剤を添付の溶解液全量で溶解し、緩徐に静脈内注射する。なお、1分間に2.5mLを超える注射速度は避けること。 通常、12歳以上の患者には、1回体重1kg当たり10～30国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。 定期的に投与する場合、通常、12歳以上の患者には、体重1kg当たり30～40国際単位を週2回投与するが、患者の状態に応じて、体重1kg当たり45～60国際単位を5日に1回投与、又は体重1kg当たり60国際単位を週1回投与することもできる。	生物、処方	H30.9.21	新有効成分
			ジビイ静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	139,307円	1000国際単位×1バイアル(添付溶解液プレフィルドシリンジ(日本薬局方注射用水2.5mL)×1シリンジ付き)							
			ジビイ静注用2000	2,000国際単位1瓶(溶解液付)	257,462円	2000国際単位×1バイアル(添付溶解液プレフィルドシリンジ(日本薬局方注射用水2.5mL)×1シリンジ付き)							
			ジビイ静注用3000	3,000国際単位1瓶(溶解液付)	368,761円	3000国際単位×1バイアル(添付溶解液プレフィルドシリンジ(日本薬局方注射用水2.5mL)×1シリンジ付き)							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
12	131	外用薬	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL	945.30円	2.5mL×5本、 2.5mL×10本	参天製薬	オミデネパ グイソプロ ビル	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日1回点眼する。	劇、処方	H30.9.21	新有効成分

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますので参照下さい。
- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。