

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考			
1	241	内用薬	ミニリンメルトOD錠25µg	25µg1錠	57.50円	100錠 [10錠 (ブリスター) ×10]	フェリン グ・ファ ーマ	デスマプレ シン酢酸塩 水和物	男性における夜間多尿による夜間頻尿	成人男性には、通常、1日1回就寝前にデスマプレシンとして50µgを経口投与する。	劇、処方	R1.6.18	新効能、新用量、剤形追加			
			ミニリンメルトOD錠50µg	50µg1錠	96.60円	100錠 [10錠 (ブリスター) ×10]										
2	429	内用薬	ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠	20,059.60円	(PTP) 10錠 (10錠×1)	第一三共	キザルチニ ブ塩酸塩	再発又は難治性のFLT3-ITD変異陽性の急性骨髄性白血病	通常、成人にはキザルチニブとして1日1回26.5mgを2週間経口投与し、それ以降は1日1回53mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R1.6.18	新有効成分			
			ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠	27,074.40円	(PTP) 10錠 (10錠×1)										
3	429	内用薬	ロズリートレカブセル100mg	100mg1カプセル	5,310.80円	30カプセル (バラ、乾燥剤入り)	中外製薬	エヌトレク チニブ	NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	通常、成人にはエヌトレクチニブとして1日1回600mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 通常、小児にはエヌトレクチニブとして1日1回300mg/m ² (体表面積) を経口投与する。ただし、600mgを超えないこと。なお、患者の状態により適宜減量する。 小児患者の用量 (300mg/m ² 1日1回経口投与)	劇、処方	R1.6.18	新有効成分			
			ロズリートレカブセル200mg	200mg1カプセル	10,073.00円	90カプセル (バラ、乾燥剤入り)								<table border="1"> <thead> <tr> <th>体表面積(m²)</th> <th>投与量(1日1回)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.43~0.50</td> <td>100mg</td> </tr> <tr> <td>0.51~0.80</td> <td>200mg</td> </tr> <tr> <td>0.81~1.10</td> <td>300mg</td> </tr> <tr> <td>1.11~1.50</td> <td>400mg</td> </tr> <tr> <td>1.51</td> <td>600mg</td> </tr> </tbody> </table>	体表面積(m ²)	投与量(1日1回)
体表面積(m ²)	投与量(1日1回)															
0.43~0.50	100mg															
0.51~0.80	200mg															
0.81~1.10	300mg															
1.11~1.50	400mg															
1.51	600mg															
4	129	注射薬	オンパット口点滴静注2mg/mL	8.8mg4.4mL1瓶	1,004,358円	2mg/mL×1	Alnylam Japan	バチシラン ナトリウム	トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチー	通常、成人には3週に1回バチシランとして0.3mg/kgを点滴静注する。体重が104kg以上の患者には3週に1回バチシランとして31.2mgを点滴静注する。いずれの場合にも、70分以上 (投与開始後15分間は約1mL/分、その後は約3mL/分) かけて投与すること。	劇、処方	R1.6.18	新有効成分			
5	391	注射薬	デファイテリオ静注200mg	200mg2.5mL1瓶	54,091円	2.5mL×10バイアル	日本新薬	デフィプロ チドナトリ ウム	肝類洞閉塞症候群 (肝中心静脈閉塞症)	通常、デフィプロチドナトリウムとして1回6.25mg/kgを1日4回、2時間かけて静脈内投与する。	処方	R1.6.18	新有効成分			
6	396	注射薬	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	5,359円	1筒3mL、2本	ノボ ル ディスク ファーマ	インスリン デグルデク (遺伝子組 換え) /リラ グルチド (遺伝子組 換え)	インスリン療法が適応となる2型糖尿病	通常、成人では、初期は1日1回10ドーズ (インスリン デグルデク/リラグルチドとして10単位/0.36mg) を皮下注射する。投与量は患者の状態に応じて適宜増減するが、1日50ドーズ (インスリン デグルデク/リラグルチドとして50単位/1.8mg) を超えないこと。注射時刻は原則として毎日一定とする。なお、本剤の用量単位である1ドーズには、インスリン デグルデク1単位及びリラグルチド0.036mgが含まれる。	劇、処方	R1.6.18	新医療用配合剤			

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
7	639	注射薬	ユルトミリス点滴静注300mg	300mg30mL 1瓶	730,894円	1/バイアル30mL	アレクシオンファーマ	ラブリズマブ(遺伝子組換え)	発作性夜間ヘモグロビン尿症	通常、成人には、ラブリズマブ(遺伝子組換え)として、患者の体重を考慮し、1回2,400~3,000mgを開始用量とし、初回投与2週後に1回3,000~3,600mg、以降8週に1回3,000~3,600mgを点滴静注する。	生物、劇、処方	R1.6.18	新有効成分
8	117	外用薬	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	273.60円	70枚(1枚/袋×70袋)、280枚(1枚/袋×280袋)	大日本住友製薬	プロナンセリン	統合失調症	通常、成人にはプロナンセリンとして40mgを1日1回貼付するが、患者の状態に応じて最大80mgを1日1回貼付することもできる。なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量は80mgを超えないこと。 本剤は、胸部、腹部、背部のいずれかに貼付し、24時間ごとに貼り替える。	劇、処方	R1.6.18	新投与経路
			ロナセンテープ30mg	30mg1枚	394.30円	70枚(1枚/袋×70袋)、280枚(1枚/袋×280袋)							
			ロナセンテープ40mg	40mg1枚	511.20円	70枚(1枚/袋×70袋)、280枚(1枚/袋×280袋)							
9	131	外用薬	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	307.80円	プラスチック点眼容器2.5mL×5、2.5mL×10	千寿製薬	アジスロマイシン水和物	適応菌種 アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、アクネ菌 適応症 結膜炎 眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎	結膜炎 通常、成人及び7歳以上の小児には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回5日間点眼する。 眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎 通常、成人には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回12日間点眼する。	処方	R1.6.18	新投与経路
10	225	外用薬	ビベスピエアロスフィア28吸入	28吸入1キット	1,787.00円	2本[1本(アルミ袋、乾燥剤入り)×2]	アストラゼネカ	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate 水和物	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 刺激剤の併用が必要な場合)	通常、成人には、1回2吸入(グリコピロニウムとして14.4µg、ホルモテロール fumarate 水和物として9.6µg)を1日2回吸入投与する。	処方	R1.6.18	新有効成分、新医療用配合剤
11	229	外用薬	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	4,150.30円	1本[1本(アルミ袋、乾燥剤入り)×1]	アストラゼネカ	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate 水和物	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 刺激剤の併用が必要な場合)	通常、成人には、1回2吸入(ブデソニドとして320µg、グリコピロニウムとして14.4µg、ホルモテロール fumarate 水和物として9.6µg)を1日2回吸入投与する。	処方	R1.6.18	新有効成分、新医療用配合剤

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
12	625	外用薬	イナビル吸入懸濁用 160mgセット	160mg1瓶	4,241.50円	5バイアル(ネ ブライザ吸入器 5個添付)	第一三共	ラニナミビ ルオクタン 酸エステル 水和物	A型又はB型インフルエン ザウイルス感染症の治療	成人及び小児には、ラニナミビルオクタン酸エステルとして160mgを日本薬局方生理食塩 液2mLで懸濁し、ネブライザを用いて単回吸入投与する。	処方	R1.6.18	新剤形
13	490		コラテジェン筋注用 4mg	4mg1.6mL1 瓶	611,478円	—	アンジェス	ベベルミノ ゲン ベルブ ラスミド	標準的な薬物治療の効果が 不十分で血行再建術の 施行が困難な慢性動脈閉 塞症（閉塞性動脈硬化症 及びパージャー病）にお ける潰瘍の改善	通常、成人には、投与対象肢の虚血部位に対して1カ所あたり本品0.5mgを8カ所に4週間 間隔で2回筋肉内投与する(1回総計4mg)。なお、臨床症状が残存する場合には、2回目投 与の4週後に3回目の投与を行うこともできる。また、投与に際しては、日局生理食塩液で 希釈し、希釈後の1カ所あたりの薬液量は3mLとし、投与対象筋が小さい場合には2mLまで 減じてよい。		H31.3.26	新再生医療等製 品

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。