

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	116	内用薬	オンジェンティス錠 25mg	25mg1錠	972.00円	30錠(PTP)、100錠(PTP、バラ)	小野薬品工業	オピカポン	レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善	本剤は、レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩と併用する。通常、成人にはオピカポンとして25mgを1日1回、レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩の投与前後及び食事の前後1時間以上あけて経口投与する。	劇、処方	R2.6.29	新有効成分
2	219	内用薬	エンレスト錠50mg	50mg1錠	65.70円	100錠[10錠(PTP)×10]	ノバルティスファーマ	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。	通常、成人にはサクビトリルバルサルタンとして1回50mgを開始用量として1日2回経口投与する。忍容性が認められる場合は、2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし、いずれの投与量においても1日2回経口投与する。なお、忍容性に応じて適宜減量する。	処方	R2.6.29	新有効成分
			エンレスト錠100mg	100mg1錠	115.20円	100錠[10錠(PTP)×10]、500錠[瓶、バラ]							
			エンレスト錠200mg	200mg1錠	201.90円	100錠[10錠(PTP)×10]							
3	399	内用薬	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	105.40円	100錠[10錠(PTP)×10]	グラクソ・スミスクライン	ダプロデュスタット	腎性貧血	1.保存期慢性腎臓病患者 赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合 通常、成人にはダプロデュスタットとして1回2mg又は4mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回24mgまでとする。 赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合 通常、成人にはダプロデュスタットとして1回4mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回24mgまでとする。 2.透析患者 通常、成人にはダプロデュスタットとして1回4mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回24mgまでとする。	劇、処方	R2.6.29	新有効成分
			ダーブロック錠2mg	2mg1錠	185.80円	100錠[10錠(PTP)×10]							
			ダーブロック錠4mg	4mg1錠	327.40円	100錠[10錠(PTP)×10]							
			ダーブロック錠6mg	6mg1錠	456.10円	100錠[10錠(PTP)×10]							
4	399	内用薬	バフセオ錠150mg	150mg1錠	213.50円	100錠[10錠(PTP)×10]	田辺三菱製薬	バタデュスタット	腎性貧血	通常、成人にはバタデュスタットとして、1回300mgを開始用量とし、1日1回経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1日1回600mgまでとする。	劇、処方	R2.6.29	新有効成分
			バフセオ錠300mg	300mg1錠	376.20円	100錠[10錠(PTP)×10]							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	399	内用薬	メーゼント錠0.25mg	0.25mg1錠	1,083.50円	14錠(PTP)×1シート	ノバルティスファーマ	シボニモド フマル酸	二次性進行型多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	通常、成人にはシボニモドとして1日0.25mgから開始し、2日目に0.25mg、3日目に0.5mg、4日目に0.75mg、5日目に1.25mg、6日目に2mgを1日1回朝に経口投与し、7日目以降は維持用量である2mgを1日1回経口投与するが、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R2.6.29	新有効成分
			メーゼント錠2mg	2mg1錠	8,668.00円	14錠(PTP)×1シート							
6	429	内用薬	タブレクタ錠150mg	150mg1錠	5,055.50円	28錠 [14錠(PTP)×2]	ノバルティスファーマ	カプマチニブ塩酸塩水和物	MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはカプマチニブとして1回400mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R2.6.29	新有効成分
			タブレクタ錠200mg	200mg1錠	6,573.50円	28錠 [14錠(PTP)×2]							
7	322	注射薬	フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶	6,078円	10mL×1バイアル、10mL×5バイアル	ゼリア新薬工業	カルボキシマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血	通常、成人に鉄として1回あたり500mgを週1回、緩徐に静注又は点滴静注する。総投与量は、患者の血中ヘモグロビン値及び体重に応じるが、上限は鉄として1,500mgとする。	処方	H31.3.26	新有効成分
8	399	注射薬	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL1筒	487,413円	1本	サンファーマ	チルドラキズマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な尋常性乾癬	通常、成人にはチルドラキズマブ(遺伝子組換え)として、1回100mgを初回、4週後、以降12週間隔で皮下投与する。	生物、劇、処方	R2.6.29	新有効成分
9	429	注射薬	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	64,699円	5mL×1バイアル	サノフィ	イサツキシマブ(遺伝子組換え)	再発又は難治性の多発性骨髄腫	ボマリドミド及びデキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはイサツキシマブ(遺伝子組換え)として1回10mg/kgを点滴静注する。28日間を1サイクルとし、最初のサイクルは1週間間隔で4回(1、8、15、22日目)、2サイクル以降は2週間間隔で2回(1、15日目)点滴静注する。	生物、劇、処方	R2.6.29	新有効成分
			サークリサ点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	285,944円	25mL×1バイアル							
10	639	注射薬	エンズプリング皮下注120mgシリンジ	120mg1mL1筒	1,532,660円	1mL×1シリンジ	中外製薬	サトラリズマブ(遺伝子組換え)	視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防	通常、成人及び小児には、サトラリズマブ(遺伝子組換え)として1回120mgを初回、2週後、4週後に皮下注射し、以降は4週間隔で皮下注射する。	生物、劇、処方	R2.6.29	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
11	229	外用薬	アテキユラ吸入用カプセル低用量	1カプセル	157.80円	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー®1個)	ノバルティスファーマ	インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステル	気管支喘息 (吸入ステロイド剤及び長時間作用性吸入β ₂ 刺激剤の併用が必要な場合)	通常、成人にはアテキユラ吸入用カプセル低用量1回1カプセル (インダカテロールとして150μg及びモメタゾンフランカルボン酸エステルとして80μg) を1日1回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。 なお、症状に応じて以下用量の1回1カプセルを1日1回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。 ・アテキユラ吸入用カプセル中用量 (インダカテロールとして150μg及びモメタゾンフランカルボン酸エステルとして160μg) ・アテキユラ吸入用カプセル高用量 (インダカテロールとして150μg及びモメタゾンフランカルボン酸エステルとして320μg)	処方	R2.6.29	新有効成分、新医療用配合剤
			アテキユラ吸入用カプセル中用量	1カプセル	173.10円	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー®1個)							
			アテキユラ吸入用カプセル高用量	1カプセル	192.20円	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー®1個)							
12	229	外用薬	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	291.90円	14カプセル (7カプセル×2シート、ブリーズヘラー®1個)	ノバルティスファーマ	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	気管支喘息 (吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入β ₂ 刺激剤及び長時間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要な場合)	通常、成人にはエナジア吸入用カプセル中用量1回1カプセル (インダカテロールとして150μg、グリコピロニウムとして50μg及びモメタゾンフランカルボン酸エステルとして80μg) を1日1回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。 なお、症状に応じてエナジア吸入用カプセル高用量1回1カプセル (インダカテロールとして150μg、グリコピロニウムとして50μg及びモメタゾンフランカルボン酸エステルとして160μg) を1日1回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。	処方	R2.6.29	新有効成分、新医療用配合剤
			エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	333.40円								
13	249	外用薬	バクスマー一点鼻粉末剤 3mg	3mg1瓶	8,386.60円	1点鼻容器 (乾燥剤入り)	日本イーライリリー	グルカゴン	低血糖時の救急処置	通常、グルカゴンとして1回3mgを鼻腔内に投与する。	劇、処方	R2.3.25	新投与経路

・薬価については官報をご確認下さい。

・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。

・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。

・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。

・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。