

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	249	内用薬	リベルサス錠3mg	3mg1錠	143.20円	100錠 [10錠(PTP)×10]、70錠 [7錠(PTP)×10]	ノボ ノルディスクファーマ	セマグルチド (遺伝子組換え)	2型糖尿病	通常、成人には、セマグルチド (遺伝子組換え) として1日1回7mgを維持用量とし経口投与する。ただし、1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量することができる。	劇、処方	R2.6.29	新投与経路
			リベルサス錠7mg	7mg1錠	334.20円	100錠 [10錠(PTP)×10]、70錠 [7錠(PTP)×10]							
			リベルサス錠14mg	14mg1錠	501.30円	100錠 [10錠(PTP)×10]、70錠 [7錠(PTP)×10]							
2	399	内用薬	エナロイ錠2mg	2mg1錠	275.90円	140錠 [14錠 (PTP)×10]	日本たばこ産業 (鳥居薬品)	エナロデュスタット	腎性貧血	1.保存期慢性腎臓患者及び腹膜透析患者 通常、成人には、エナロデュスタットとして1回1mgを開始用量とし、1日1回食前又は就寝前に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回8mgとする。 2.血液透析患者 通常、成人には、エナロデュスタットとして1回4mgを開始用量とし、1日1回食前又は就寝前に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1回8mgとする。	劇、処方	R2.9.25	新有効成分
			エナロイ錠4mg	4mg1錠	486.10円	140錠 [14錠 (PTP)×10]							
3	399	内用薬	ジゼレカ錠100mg	100mg1錠	2,550.90円	14錠 [14錠×1] PTP	ギリアド・サイエンシズ	フィルゴチニブマレイン酸塩	既存治療で効果不十分な関節リウマチ (関節の構造的損傷の防止を含む)	通常、成人にはフィルゴチニブとして200mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態に応じて100mgを1日1回投与できる。	劇、処方	R2.9.25	新有効成分
			ジゼレカ錠200mg	200mg1錠	4,972.80円	14錠 [14錠×1] PTP							
4	429	内用薬	ゼジューラカプセル100mg	100mg1カプセル	10,370.20円	PTP14カプセル (14カプセル×1)	武田薬品工業	ニラバリブトシル酸塩水和物	卵巣癌における初回化学療法後の維持療法 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌	通常、成人にはニラバリブとして1日1回200mgを経口投与する。ただし、本剤初回投与前の体重が77kg以上かつ血小板数が150,000/μL以上の成人にはニラバリブとして1日1回300mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜増減する。	劇、処方	R2.9.25	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	117	注射薬	ゼプリオンTRI水懸筋注 175mgシリンジ	175mg1キッ ト	64,540円	0.875mL[1シリン ジ]	ヤンセン ファーマ	パリペリド ンバルミチ ン酸エステ ル	統合失調症（パリペリドン4 週間隔筋注製剤による適切 な治療が行われた場合に限 る）	本剤は、パリペリドン4週間隔筋注製剤が4ヵ月以上継続して投与され、適切な治療が行わ れた患者に対し、最終投与の4週間後から切り替えて使用する。通常、成人には、パリペリ ドンとして、パリペリドン4週間隔筋注製剤最終投与量の3.5倍量を、12週間に1回、三角 筋又は臀部筋に筋肉内投与する。	劇、処方	R2.9.25	新効能医薬品 新剤形医薬品
			ゼプリオンTRI水懸筋注 263mgシリンジ	263mg1キッ ト	84,829円	1.315mL[1シリン ジ]							
			ゼプリオンTRI水懸筋注 350mgシリンジ	350mg1キッ ト	102,748円	1.75mL[1シリンジ]							
			ゼプリオンTRI水懸筋注 525mgシリンジ	525mg1キッ ト	134,858円	2.625mL[1シリン ジ]							
6	122	注射薬	ゼオマイン筋注用50単 位	50単位1瓶	18,707円	50単位×1バイアル	帝人ファ ーマ	インコボツ リヌストキ シンA	上肢痙縮	通常、成人にはインコボツリヌストキシンAとして複数の緊張筋 ^注 に合計400単位を分割 して筋肉内注射する。1回あたりの最大投与量は400単位であるが、対象となる緊張筋の種 類や数により、投与量は必要最小限となるよう適宜減量する。また、再投与は前回の効果 が減弱した場合に可能であるが、投与間隔は12週以上とすること。なお、症状に応じて投 与間隔は10週まで短縮できる。 注）緊張筋：橈側手根屈筋、尺側手根屈筋、浅指屈筋、深指屈筋、腕橈骨筋、上腕二頭 筋、上腕筋、方形回内筋、円回内筋、長母指屈筋、母指内転筋、短母指屈筋/母指対立筋等	生物、 毒、処方	R2.6.29	新有効成分
			ゼオマイン筋注用100単 位	100単位1瓶	34,646円	100単位×1バイアル							
			ゼオマイン筋注用200単 位	200単位1瓶	68,922円	200単位×1バイアル							
7	429	注射薬	アキラルックス点滴静 注250mg	250mg50mL 1瓶	1,026,825円	1バイアル	楽天メディ カルジャパ ン	セツキシマ ブ サロタ ロカンナト リウム（遺 伝子組換 え）	切除不能な局所進行又は局 所再発の頭頸部癌	通常、成人にはセツキシマブ サロタロカンナトリウム（遺伝子組換え）として、1回 640mg/m ² （体表面積）を2時間以上かけて点滴静注する。点滴静注終了20～28時間後に レーザー光を病巣部位に照射する。	生物、 劇、処方	R2.9.25	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
8	113	外用薬	ブコラム口腔用液 2.5mg	2.5mg0.5mL 1筒	1,125.80円	0.5mL×4シリンジ	武田薬品工業	ミダゾラム	てんかん重積状態	通常、修正在胎52週（在胎週数+出生後週数）以上1歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回2.5mg、1歳以上5歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回5mg、5歳以上10歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回7.5mg、10歳以上18歳未満の患者には、ミダゾラムとして1回10mgを頬粘膜投与する。	向、習、 処方	R2.9.25	新投与経路医薬品
			ブコラム口腔用液5mg	5mg1mL1筒	1,977.80円	1.0mL×4シリンジ							
			ブコラム口腔用液 7.5mg	7.5mg1.5mL 1筒	2,750.00円	1.5mL×4シリンジ							
			ブコラム口腔用液10mg	10mg2mL1筒	3,474.60円	2.0mL×4シリンジ							
9	125	外用薬	エクロックゲル5%	5%1g	243.70円	20g入りボトル×1本	科研製薬	ソフピロニウム臭化物	原発性腋窩多汗症	1日1回、適量を腋窩に塗布する。	処方	R2.9.25	新有効成分

・薬価については官報をご確認下さい。

・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。

・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。

・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。

・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。