

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考																																																																				
1	333	内用薬	イグザレルトドライシ ロップ小児用51.7mg	51.7mg1瓶	5308.30円	1瓶	バイエル薬 品	リバーロキサ バン	静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制	通常、体重2.6kg以上12kg未満の小児には下記の用量を1回量とし、1日3回経口投与 する。体重12kg以上30kg未満の小児にはリバーロキサバンとして5mgを1日2回、 体重30kg 以上の小児には15mgを1日1回経口投与する。いずれも空腹時を避けて投 与し、1日1回、2回及び3回投与においては、それぞれ約24時間、約12時間及び約8 時間おきに投与する。 <table border="1" data-bbox="1326 347 1796 555"> <thead> <tr> <th rowspan="2">体重(kg)</th> <th colspan="3">1回量</th> <th rowspan="2">1日用量</th> </tr> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> <th>1日1回投与</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6</td> <td>< 3</td> <td></td> <td></td> <td>0.8mg (0.8mL)</td> <td>2.4mg</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>< 4</td> <td></td> <td></td> <td>0.9mg (0.9mL)</td> <td>2.7mg</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>< 5</td> <td></td> <td></td> <td>1.4mg (1.4mL)</td> <td>4.2mg</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 7</td> <td></td> <td></td> <td>1.6mg (1.6mL)</td> <td>4.8mg</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>< 8</td> <td></td> <td></td> <td>1.8mg (1.8mL)</td> <td>5.4mg</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>< 9</td> <td></td> <td></td> <td>2.4mg (2.4mL)</td> <td>7.2mg</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>< 10</td> <td></td> <td></td> <td>2.8mg (2.8mL)</td> <td>8.4mg</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>< 12</td> <td></td> <td></td> <td>3mg (3mL)</td> <td>9.0mg</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>< 30</td> <td></td> <td>5mg (5mL)</td> <td></td> <td>10mg</td> </tr> <tr> <td>≥30</td> <td></td> <td>15mg (15mL)</td> <td></td> <td></td> <td>15mg</td> </tr> </tbody> </table>	体重(kg)	1回量			1日用量	最小	最大	1日1回投与	2.6	< 3			0.8mg (0.8mL)	2.4mg	3	< 4			0.9mg (0.9mL)	2.7mg	4	< 5			1.4mg (1.4mL)	4.2mg	5	< 7			1.6mg (1.6mL)	4.8mg	7	< 8			1.8mg (1.8mL)	5.4mg	8	< 9			2.4mg (2.4mL)	7.2mg	9	< 10			2.8mg (2.8mL)	8.4mg	10	< 12			3mg (3mL)	9.0mg	12	< 30		5mg (5mL)		10mg	≥30		15mg (15mL)			15mg	処方	R3.1.22	新用量・新剤 形医薬品
			体重(kg)	1回量			1日用量																																																																										
最小	最大	1日1回投与																																																																															
2.6	< 3			0.8mg (0.8mL)	2.4mg																																																																												
3	< 4			0.9mg (0.9mL)	2.7mg																																																																												
4	< 5			1.4mg (1.4mL)	4.2mg																																																																												
5	< 7			1.6mg (1.6mL)	4.8mg																																																																												
7	< 8			1.8mg (1.8mL)	5.4mg																																																																												
8	< 9			2.4mg (2.4mL)	7.2mg																																																																												
9	< 10			2.8mg (2.8mL)	8.4mg																																																																												
10	< 12			3mg (3mL)	9.0mg																																																																												
12	< 30		5mg (5mL)		10mg																																																																												
≥30		15mg (15mL)			15mg																																																																												
2	399	内用薬	マスーレッド錠5mg	5mg1錠	44.30円	100錠 [10錠 (PTP) × 10]	バイエル薬 品	モリデュス タットナト リウム	腎性貧血	<保存期慢性腎臓病患者> 赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合 通常、成人にはモリデュスタットとして1回25mgを開始用量とし、1日1回食後に 経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1 回200mgとする。 赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合 通常、成人にはモリデュスタットとして25mg又は50mgを開始用量とし、1日1回 食後に経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用 量は1回200mgとする。 <透析患者> 通常、成人にはモリデュスタットとして1回75mgを開始用量とし、1日1回食後に 経口投与する。以後は、患者の状態に応じて投与量を適宜増減するが、最高用量は1 回200mgとする。	劇、処方	R3.1.22	新有効成分																																																																				
			マスーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠	93.70円	100錠 [10錠 (PTP) × 10]																																																																											
			マスーレッド錠25mg	25mg1錠	165.10円	100錠 [10錠 (PTP) × 10]																																																																											
			マスーレッド錠75mg	75mg1錠	405.30円	100錠 [10錠 (PTP) × 10]																																																																											
3	399	内用薬	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	246.40円	100錠 (PTP)	小野薬品工 業	アナモレリ ン塩酸塩	下記の悪性腫瘍におけるがん悪液質 非小細胞肺癌、胃癌、肝癌、大腸癌	通常、成人にはアナモレリン塩酸塩として100mgを1日1回、空腹時に経口投与す る。	劇、処方	R3.1.22	新有効成分																																																																				
4	429	内用薬	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠	4,200.50円	患者さん用パッケージ付 PTP 28錠 (14錠シート× 2)	武田薬品工 業	ブリグチニ ブ	ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進 行・再発の非小細胞肺癌	通常、成人にはブリグチニブとして、1日1回90mgを7日間経口投与する。その後、 1日1回180mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R3.1.22	新有効成分																																																																				
			アルンブリグ錠90mg	90mg1錠	11,598.00円	患者さん用パッケージ付 PTP 14錠 (7錠シート× 2)																																																																											

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
5	429	内用薬	カルケンスカプセル 100mg	100mg1カプセル	15,202.20円	14カプセル [7カプセル (PTP) ×2]	アストラゼネカ	アカラブルチニブ	再発又は難治性の慢性リンパ性白血病 (小リンパ球性リンパ腫を含む)	通常、成人にはアカラブルチニブとして1回100mgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R3.1.22	新有効成分
6	449	内用薬	オラデオカプセル 150mg	150mg1カプセル	74,228.20円	PTP: (7カプセル×1)	オーファンバシフィック	ヘロトラルスタット塩酸塩	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	通常、成人及び12歳以上の小児には、ヘロトラルスタットとして150mg (1カプセル) を1日1回経口投与する。	処方	R3.1.22	新有効成分
7	799	内用薬	サルプレップ配合内用液	480mL1瓶	1,011.60円	480mL×10本	日本製薬	無水硫酸ナトリウム/硫酸カリウム/硫酸マグネシウム水和物	大腸内視鏡検査時の前処置における腸管内容物の排除	<p><検査当日に投与する場合></p> <p>通常、成人には本剤480mLを30分かけて経口投与する。本剤480mLを投与した後、水又はお茶約1Lを1時間かけて飲用する。以降、排泄液が透明になるまで本剤240mLあたり15分かけて投与し、投与後に水又はお茶約500mLを飲用するが、本剤の投与量は合計960mLまでとする。</p> <p>なお、検査前日の夕食後は絶食 (水分摂取は可) とし、検査開始予定時間の約3時間以上前から投与を開始する。</p> <p><検査前日と当日に分けて2回投与する場合></p> <p>通常、成人には検査前日に、本剤480mLを30分かけて経口投与する。本剤480mLを投与した後、水又はお茶約1Lを1時間かけて飲用する。検査当日は、検査開始予定時間の約2時間以上前から、排泄液が透明になるまで本剤240mLあたり15分かけて投与し、投与後に水又はお茶約500mLを飲用するが、本剤の投与量は前日から合計960mLまでとする。</p> <p>なお、検査前日の夕食は投与開始の3時間以上前に終了し、夕食後は絶食 (水分摂取は可) とする。</p>	処方	R3.1.22	新医療用配合剤
8	119	注射薬	エムガルティ皮下注 120mgオートインジェクター	120mg1mL1キット	45,165円	1mL [1オートインジェクター]	日本イーライリリー	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	片頭痛発作の発症抑制	通常、成人にはガルカネズマブ (遺伝子組換え) として初回に240mgを皮下投与し、以降は1か月間隔で120mgを皮下投与する。	生物、処方	R3.1.22	新有効成分
			エムガルティ皮下注 120mgシリンジ	120mg1mL1筒	44,940円	1mL [1シリンジ]							
9	395	注射薬	ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg	15mg1mL1瓶	1,981,462円	1mL [1バイアル]	クリニジェン	イデュルスルファーゼベータ (遺伝子組換え)	ムコ多糖症Ⅱ型	通常、イデュルスルファーゼベータ (遺伝子組換え) として、1回30mgを4週間に1回、脳室内投与する。	生物、劇、処方	R3.1.22	新有効成分 (希少疾病用医薬品)

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
10	634	注射薬	リンスパッド点滴静注用 1000mg	1000mg1瓶	216,054円	1000mg1バイアル(日局 注射用水 20mL×1バイアル 添付)	オーファン バシフィック	ヒトα ₁ -プロ テイナーゼ インヒビ ター	重症α ₁ -アンチトリプシン欠症	通常、成人にはヒトα ₁ -プロテイナーゼインヒビターとして60mg/kgを週1回、点滴 静注する。	特生、処 方	R3.1.22	新有効成分
11	259	外用薬	ジムソ膀胱内注入液 50%	50%50mL1瓶	11,210.50円	50mL [1バイアル]	杏林製薬	ジメチルス ルホキシド	間質性膀胱炎(ハンナ型)の諸症状 (膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼 痛、圧迫感及び不快感、尿意亢進又は 頻尿等の下部尿路症状)の改善	通常、成人には50% (w/w) ジメチルスルホキシド溶液を1回あたり1バイアル 50mL(ジメチルスルホキシドとして27g)、2週間間隔で6回膀胱内に注入する。な お、膀胱内注入後、可能な限り15分間以上膀胱内に保持してから排出させる。	処方	R3.1.22	新有効成分 (希少疾病用 医薬品)
12	490		イエスカルト点滴静注	1患者当たり	32,647,761 円	-	第一三共	アキシカブ タゲン シロ ルユーセル	以下の再発又は難治性の大細胞型B細 胞リンパ腫 □びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、 原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫、 形質転換濾胞性リンパ腫、高悪性度B 細胞リンパ腫 ただし、以下のいずれも満たす場合に 限る。 □CD19抗原を標的としたキメラ抗原 受容体発現T細胞輸注療法の治療歴が ない □自家造血幹細胞移植に適応がある患 者であって、初発の患者では化学療法 を2回以上、再発の患者では再発後に 化学療法を1回以上施行したが奏効が 得られなかった若しくは自家造血幹細 胞移植後に再発した場合、又は自家造 血幹細胞移植に適応がない患者	通常、成人には抗CD19 CAR T細胞として2.0×10 ⁶ 個/kg(体重)を目安に(体重 100kg以上の患者の最大投与量は2×10 ⁸ 個を)、5分以上かけて30分を超えないよ うに単回静脈内投与する。なお、本品の再投与はしないこと。		R3.1.22	再生医療等 製品 (希少疾病用 再生医療等製 品)

・薬価については官報をご確認下さい。

・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。

・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。

・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。

・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。

・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。