

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	119	内用薬	ジスバレルカプセル40mg	40mg1カプセル	2,331.20円	100カプセル [10カプセル (PTP) ×10]	田辺三菱製薬	バロベナジン トシル酸塩	遅発性ジスキネジア	通常、成人にはバロベナジンとして1日1回40mgを経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、1日1回80mgを超えないこととする。	劇、処方	R4.3.28	新有効成分
2	219	内用薬	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	149.10円	100錠 [10錠 (PTP) ×10]	バイエル薬品	フィネレノン	2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。	通常、成人にはフィネレノンとして以下の用量を1日1回経口投与する。 eGFRが60mL/min/1.73m ² 以上：20mg eGFRが60mL/min/1.73m ² 未満：10mgから投与を開始し、血清カリウム値、eGFRに応じて、投与開始から4週間後を目安に20mgへ増量する。	処方	R4.3.28	新有効成分
			ケレンディア錠20mg	20mg1錠	213.10円	100錠 [10錠 (PTP) ×10]							
3	239	内用薬	カロテグラ錠120mg	120mg1錠	200.00円	336錠 [8錠 (PTP) ×21シート×2ピロー]	EAファーマ	カロテグラストメチル	中等症の潰瘍性大腸炎（5-アミノサリチル酸製剤による治療で効果不十分な場合に限る）	通常、成人にはカロテグラストメチルとして1回960mgを1日3回食後経口投与する。	劇、処方	R4.3.28	新有効成分
4	399	内用薬	タブネオスカプセル10mg	10mg1カプセル	1,403.90円	60カプセル [6カプセル (PTP) ×10]	キッセイ薬品工業	アバコパン	顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症	通常、成人にはアバコパンとして1回30mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。	処方	R3.9.27	新有効成分
5	429	内用薬	セムブリックス錠20mg	20mg1錠	5,564.50円	20錠 [10錠 (PTP) ×2]	ノバルティスファーマ	アシミニブ塩酸塩	前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性白血病	通常、成人にはアシミニブとして1回40mgを1日2回、空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R4.3.28	新有効成分
			セムブリックス錠40mg	40mg1錠	10,618.30円	20錠 [10錠 (PTP) ×2]							
6	131	注射薬	バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL	6mg0.05mL1瓶	163,894円	0.24mL×1バイアル（専用フィルター付き採液針1本添付）	中外製薬	ファリシマブ（遺伝子組換え）	中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 糖尿病黄斑浮腫	〈中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性〉 ファリシマブ（遺伝子組換え）として6.0mg（0.05mL）を4週ごとに1回、通常、連続4回（導入期）硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期においては、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。 〈糖尿病黄斑浮腫〉 ファリシマブ（遺伝子組換え）として6.0mg（0.05mL）を4週ごとに1回、通常、連続4回硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後は、投与間隔を徐々に延長し、通常、16週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、4週以上あけること。	生物、 劇、処方	R4.3.28	新有効成分
7	213	注射薬	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	1,160円	1バイアル×10本	大塚製薬	トル（ブタンリン酸エステルナトリウム	ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	通常、成人にはトル（ブタンリン酸エステルナトリウムとして16mgを1日1回1時間かけて点滴静注する。	劇、処方	R4.3.28	新有効成分
			サムタス点滴静注用16mg	16mg1瓶	2,169円	1バイアル×10本							
8	239	注射薬	アロカリス点滴静注 235mg	235mg10mL1瓶	11,276円	5バイアル	大鵬薬品工業	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）（遅発期を含む）	他の制吐剤との併用において、通常、成人にはホスネツピタントとして235mgを抗悪性腫瘍剤投与1日目に1回、点滴静注する。	劇、処方	R4.3.28	新有効成分
9	339	注射薬	オンデキサ静注用200mg	200mg1瓶	338,671円	1バイアル	アレクシオンファーマ	アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）	直接作用型第Xa因子阻害剤（アピキサバン、リバーロキサバン又はエドキサバントシル酸塩水和物）投与中の患者における、生命を脅かす出血又は止血困難な出血の発現時の抗凝固作用の中和	通常、成人には、直接作用型第Xa因子阻害剤の種類、最終投与時の1回投与量、最終投与からの経過時間に応じて、アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）として、以下のA法又はB法の用法及び用量で静脈内投与する。 A法：400mgを30mg/分の速度で静脈内投与し、続いて480mgを4mg/分の速度で2時間静脈内投与する。 B法：800mgを30mg/分の速度で静脈内投与し、続いて960mgを8mg/分の速度で2時間静脈内投与する。	生物、処方	R4.3.28	新有効成分
10	395	注射薬	メブセヴィ点滴静注液 10mg	10mg5mL1瓶	259,932円	1バイアル	アミカス・セラピューティクス	ベストロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	ムコ多糖症VII型	通常、ベストロニダーゼ アルファ（遺伝子組換え）として、1回体重1kgあたり4mgを隔週点滴静注する。	生物、 劇、処方	R4.1.20	新有効成分

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考																																			
11	395	注射薬	ゼンフォザイム点滴静注用 20mg	20mg1瓶	570,420円	1バイアル	サノフィ	オリブダーゼ アルファ（遺伝子組換え）	酸性スフィンゴミエリナーゼ欠損症	<p>通常、オリブダーゼ アルファ（遺伝子組換え）として、以下の用量漸増法に従い、本剤の開始用量及びその後の用量を隔週点滴静脈内投与する。維持用量は、通常、1回体重1kgあたり3mgとする。</p> <table border="1"> <caption>成人患者における用量漸増法</caption> <tr><td>初回投与（初日）</td><td>0.1mg/kg</td></tr> <tr><td>2 回目投与（2 週目）</td><td>0.3mg/kg</td></tr> <tr><td>3 回目投与（4 週目）</td><td>0.3mg/kg</td></tr> <tr><td>4 回目投与（6 週目）</td><td>0.6mg/kg</td></tr> <tr><td>5 回目投与（8 週目）</td><td>0.6mg/kg</td></tr> <tr><td>6 回目投与（10週目）</td><td>1 mg/kg</td></tr> <tr><td>7 回目投与（12週目）</td><td>2 mg/kg</td></tr> <tr><td>8 回目以降の投与（14週目以降）</td><td>3 mg/kg</td></tr> </table> <table border="1"> <caption>小児患者における用量漸増法</caption> <tr><td>初回投与（初日）</td><td>0.03mg/kg</td></tr> <tr><td>2 回目投与（2 週目）</td><td>0.1mg/kg</td></tr> <tr><td>3 回目投与（4 週目）</td><td>0.3mg/kg</td></tr> <tr><td>4 回目投与（6 週目）</td><td>0.3mg/kg</td></tr> <tr><td>5 回目投与（8 週目）</td><td>0.6mg/kg</td></tr> <tr><td>6 回目投与（10週目）</td><td>0.6mg/kg</td></tr> <tr><td>7 回目投与（12週目）</td><td>1 mg/kg</td></tr> <tr><td>8 回目投与（14週目）</td><td>2 mg/kg</td></tr> <tr><td>9 回目以降の投与（16週目以降）</td><td>3 mg/kg</td></tr> </table>	初回投与（初日）	0.1mg/kg	2 回目投与（2 週目）	0.3mg/kg	3 回目投与（4 週目）	0.3mg/kg	4 回目投与（6 週目）	0.6mg/kg	5 回目投与（8 週目）	0.6mg/kg	6 回目投与（10週目）	1 mg/kg	7 回目投与（12週目）	2 mg/kg	8 回目以降の投与（14週目以降）	3 mg/kg	初回投与（初日）	0.03mg/kg	2 回目投与（2 週目）	0.1mg/kg	3 回目投与（4 週目）	0.3mg/kg	4 回目投与（6 週目）	0.3mg/kg	5 回目投与（8 週目）	0.6mg/kg	6 回目投与（10週目）	0.6mg/kg	7 回目投与（12週目）	1 mg/kg	8 回目投与（14週目）	2 mg/kg	9 回目以降の投与（16週目以降）	3 mg/kg				
初回投与（初日）	0.1mg/kg																																															
2 回目投与（2 週目）	0.3mg/kg																																															
3 回目投与（4 週目）	0.3mg/kg																																															
4 回目投与（6 週目）	0.6mg/kg																																															
5 回目投与（8 週目）	0.6mg/kg																																															
6 回目投与（10週目）	1 mg/kg																																															
7 回目投与（12週目）	2 mg/kg																																															
8 回目以降の投与（14週目以降）	3 mg/kg																																															
初回投与（初日）	0.03mg/kg																																															
2 回目投与（2 週目）	0.1mg/kg																																															
3 回目投与（4 週目）	0.3mg/kg																																															
4 回目投与（6 週目）	0.3mg/kg																																															
5 回目投与（8 週目）	0.6mg/kg																																															
6 回目投与（10週目）	0.6mg/kg																																															
7 回目投与（12週目）	1 mg/kg																																															
8 回目投与（14週目）	2 mg/kg																																															
9 回目以降の投与（16週目以降）	3 mg/kg																																															
12	449	注射薬	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	300mg2mL1筒	1,288,729円	1シリンジ	武田薬品工業	ラナデルマブ（遺伝子組換え）	遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制	通常、成人及び12歳以上の小児には、ラナデルマブ（遺伝子組換え）として1回300mgを2週間隔で皮下注射する。なお、継続的に発作が観察されず、症状が安定している場合には、1回300mgを4週間隔で皮下注射することもできる。	生物、処方	R4.3.28	新有効成分																																			
13	449	注射薬	ミチーカ皮下注用60mgシリンジ	60mg1筒	117,181円	シリンジ：60mg×1	マルホ	ネモリスマブ（遺伝子組換え）	アトピー性皮膚炎に伴うそう痒（既存治療で効果不十分な場合に限る）	通常、成人及び13歳以上の小児にはネモリスマブ（遺伝子組換え）として1回60mgを4週間の間隔で皮下投与する。	生物、処方	R4.3.28	新有効成分																																			
14	269	外用薬	モイゼルト軟膏0.3%	0.3%1g	142.00円	チューブ：10g×10本	大塚製薬	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎	通常、成人には1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。 通常、小児には0.3%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、1%製剤を1日2回、適量を患部に塗布することができる。	処方	R3.9.27	新有効成分																																			
			モイゼルト軟膏1%	1%1g	152.10円	チューブ：10g×10本																																										

- ・薬価については官報をご確認ください。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。