

報告品目・新キット製品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	備考
1	214	内用薬	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg 1錠	47.80	第一三共	エサキセレン	高血圧症	通常、成人にはエサキセレンとして2.5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合は、5mgまで増量することができる。	再審査期間中の剤形追加
			ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg 1錠	91.60					
			レミネプロOD錠5mg	5mg 1錠	137.40					
2	396	内用薬	ルセフィODフィルム2.5mg	2.5mg 1錠	161.20	大正製薬	ルセオグリフロジン水和物	2型糖尿病	通常、成人にはルセオグリフロジンとして2.5mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら5mg1日1回に増量することができる。	再審査期間中の剤形追加
3	429	内用薬	ゼジューラ錠100mg	100mg 1錠	10,370.20	武田薬品工業	ニラパリブシル酸塩水和物	卵巣癌における初回化学療法後の維持療法 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法 白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌	通常、成人にはニラパリブとして1日1回200mgを経口投与する。ただし、本剤初回投与前の体重が77kg以上かつ血小板数が150,000/μL以上の成人にはニラパリブとして1日1回300mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。	再審査期間中の剤型追加
4	429	注射薬	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5 mL1 キット	11,008	ノボノルディスクファーマ	セマグルチド(遺伝子組換え)	2型糖尿病	通常、成人には、セマグルチド(遺伝子組換え)として週1回0.5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回0.25mgから開始し、4週間投与した後、週1回0.5mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回0.5mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、週1回1.0mgまで増量することができる。	新有効成分含有医薬品
5	341	注射薬	リンバック透析剤TA5	2袋1組	1,597	ニプロ	人工透析液(A剤は塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、塩化マグネシウム、無水酢酸ナトリウム、ブドウ糖、B剤は炭酸水素ナトリウム)	慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として、以下の要因を持つものに用いる。 ○重炭酸濃度の高い重炭酸型透析液では、過度のアルカローシスを起こすおそれのある場合 ○無糖の透析液では、血糖値管理の困難な場合 ○他の重炭酸型透析液では、高カリウム血症、高マグネシウム血症の改善が不十分な場合、あるいは高カルシウム血症を起こすおそれのある場合	通常、A剤を水に溶かし、9Lとする(A液)。別にB剤を水に溶かし、11.34Lとする(B液)。このA液及びB液を、A液：B液：水=1：1.26：32.74の比率で希釈・調製する重炭酸型透析液供給装置を用いて血液透析を行う灌流液とする。用量は透析時間により異なるが、通常、灌流液として150～300Lを用いる。	類似処方医療用配合剤

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	備考
6	429	注射薬	ペバシズマブ BS点滴静注 100mg「日医 工」	100mg4 mL1瓶	14,286	日医工	ペバシズマブ (遺伝子組換 え) [ペバシ ズマブ後続3]	治癒切除不能な進行・再発の結腸・ 直腸癌 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・ 再発の非小細胞肺癌	[治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌] 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはペバシズマブ(遺伝子組換え) [ペバシズマブ後続3]として1回5mg/kg(体重)又は10mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は2週間以上とする。 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはペバシズマブ(遺伝子組換え) [ペバシズマブ後続3]として1回7.5mg/kg(体重)を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。	バイオ後続品
			ペバシズマブ BS点滴静注 400mg「日医 工」	400mg1 6mL1瓶	54,403					
7	131	外用薬	エイベリスミ 二点眼液 0.002%	0.002% 0.3mL1 個	93.90	参天製薬	オミデネバグ インプロビル	緑内障、高眼圧症	1回1滴、1日1回点眼する。	再審査期間中 の規格追加
8	225	外用薬	ビベスピエア ロスフィア 120吸入	120吸入 1キット	6,757.20	アストラ ゼネカ	グリコピロニ ウム臭化物/ホル モテロールフ マル酸塩水和 物	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、 肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく 諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗 コリン剤及び長時間作用性吸入β ₂ 刺 激剤の併用が必要な場合)	通常、成人には、1回2吸入(グリコピロニウムとして14.4μg、ホルモテロールフマル酸塩として9.6μg)を1日2回吸入投与する。	新有効成分含 有医薬品、新 医療用配合剤
9	229	外用薬	ビレーズトリ エアロスフィ ア120吸入	120吸入 1キット	8,771.90	アストラ ゼネカ	ブデソニド/グ リコピロニウ ム臭化物/ホル モテロールフ マル酸塩水和 物	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、 肺気腫)の諸症状の緩解(吸入ステ ロイド剤、長時間作用性吸入抗コ リン剤及び長時間作用性吸入β ₂ 刺 激剤の併用が必要な場合)	通常、成人には、1回2吸入(ブデソニドとして320μg、グリコピロニウムとして14.4μg、ホルモテロールフマル酸塩として9.6μg)を1日2回吸入投与する。	新有効成分含 有医薬品、新 医療用配合剤

- ・内容についての詳細な情報又は正確な情報は、添付文書等をご参照下さい。
- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認ください。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。