

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	218	内用薬	エパデールEMカプセル2g	2g1包	113.00	スティック包装：56包、280包	持田製薬	イコサベント酸エチル	高脂血症	イコサベント酸エチルとして、通常、成人には1回2gを1日1回、食直後に経口投与する。ただし、トリグリセリド高値の程度により、1回4g、1日1回まで増量できる。	-	R4.6.20	新剤形医薬品
2	333	内用薬	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	117.80	100錠【10錠(PTP)×10】	バイエル薬品	リバーロキサバン	下肢血行再建術施行後の末梢動脈疾患患者における血栓・塞栓形成の抑制	通常、成人にはリバーロキサバンとして2.5mgを1日2回経口投与する。	処方	R4.6.20	新効能医薬品、新用量医薬品、剤形追加に係る医薬品(再審査期間中でないもの)
3	429	内用薬	ジエゼリ錠40mg	40mg1錠	6,265.00	PTP包装：40錠(10錠×4)	大鵬薬品工業	ピミテスビブ	がん化学療法後に増悪した消化管間質腫瘍	通常、成人にはピミテスビブとして1日1回160mgを空腹時に投与する。5日間連続経口投与したのち2日間休薬し、これを繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R4.6.20	新有効成分
4	625	内用薬	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル	2,357.80	40カプセル【瓶、バラ】	MSD	モルヌピラビル	SARS-CoV-2による感染症	通常、18歳以上の患者には、モルヌピラビルとして1回800mgを1日2回、5日間経口投与する。	劇、処方	R3.12.24	新有効成分
5	399	注射薬	ボックスソゴ皮下注用0.4mg	0.4mg1瓶(溶解液付)	121,034	1バイアル(注射用水0.5mL/プレフィルドシリンジ1シリンジ添付)	BioMarin Pharmaceutical Japan	ボソリチド(遺伝子組換え)	骨端線閉鎖を伴わない軟骨無形成症	通常、ボソリチド(遺伝子組換え)として、2歳以上の患者には15µg/kgを、2歳未満の患者には30µg/kgを1日1回、皮下注射する。ただし、1回投与量は1mgを超えないこと。	処方	R4.6.20	新有効成分
			ボックスソゴ皮下注用0.56mg	0.56mg1瓶(溶解液付)	124,241	1バイアル(注射用水0.7mL/プレフィルドシリンジ1シリンジ添付)							
			ボックスソゴ皮下注用1.2mg	1.2mg1瓶(溶解液付)	124,994	1バイアル(注射用水0.6mL/プレフィルドシリンジ1シリンジ添付)							
6	429	注射薬	ダルピアス点滴静注用135mg	135mg1瓶	31,692	1バイアル	ソレイジア・ファーマ	ダリナバルシン	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	通常、成人にはダリナバルシンとして1日1回300mg/m ² (体表面積)を1時間かけて5日間点滴静注した後、16日間休薬する。この21日間を1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。	劇、処方	R4.6.20	新有効成分
7	639	注射薬	エジャイモ点滴静注1.1g	1.1g22mL1瓶	244,074	22mL【1バイアル】	サノフィ	スチムリマブ(遺伝子組換え)	寒冷凝集素症	通常、成人にはスチムリマブ(遺伝子組換え)として、1回6.5g又は7.5gを点滴静注する。初回投与後は、1週間後に投与し、以後2週間の間隔で投与する。	生物、劇、処方	R4.6.20	新有効成分

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。