

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	119	内用薬	ラジカット内用懸濁液 2.1%	2.1%1mL	2,751.90	ボトル：35mL、50mL	田辺三菱製薬	エダラボン	筋萎縮性側索硬化症（ALS）における機能障害の進行抑制	通常、成人に1回5mL（エダラボンとして105mg）を空腹時に1日1回経口投与する。 通常、本剤投与期と休業期を組み合わせた28日間を1クールとし、これを繰り返す。第1クールは14日間連日投与する投与期の後14日間休業し、第2クール以降は14日間のうち10日間投与する投与期の後14日間休業する。	処方	R4.12.23	新投与経路医薬品
2	399	内用薬	タバリス錠100mg	100mg1錠	4,188.00	60錠 [10錠 (PTP) ×6]	キッセイ薬品工業	ホスタマチニブナトリウム水和物	慢性特発性血小板減少性紫斑病	通常、成人には、ホスタマチニブとして初回投与量100mgを1日2回、経口投与する。初回投与量を4週間以上投与しても目標とする血小板数の増加が認められず、安全性に問題がない場合は150mgを1日2回に増量する。なお、血小板数、症状に応じて適宜増減するが、最高投与量は1回150mgを1日2回とする。	処方、劇	R4.12.23	新有効成分
			タバリス錠150mg	150mg1錠	6,226.80	60錠 [10錠 (PTP) ×6]							
3	617	内用薬	クレセンパカプセル 100mg	100mg1カプセル	4,505.70	28カプセル [7カプセル (シート) ×4、乾燥剤入り (シート内部)]	旭化成ファーマ	イサブコナゾニウム硫酸塩	下記の真菌症の治療 ○アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ） ○ムーコル症 ○クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））	通常、成人にはイサブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回経口投与する。6回目投与の12～24時間経過後、イサブコナゾールとして1回200mgを1日1回経口投与する。	劇、処方	R4.12.23	新有効成分
4	625	内用薬	パキロビッドバック300	1シート	12,538.60	20錠 [ニルマトレルビル錠：2錠及びリトナビル錠：2錠 (PTP) ×5]	ファイザー	ニルマトレルビル・リトナビル	SARS-CoV-2による感染症	通常、成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児には、ニルマトレルビルとして1回300mg及びリトナビルとして1回100mgを同時に1日2回、5日間経口投与する。	劇、処方、特例承認	R4.2.10	新有効成分
			パキロビッドバック600	1シート	19,805.50	30錠 [ニルマトレルビル錠：4錠及びリトナビル錠：2錠 (PTP) ×5]							
5	249	注射薬	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット	1,924	0.5mL×2キット	日本イーライリリー	チルゼバチド	2型糖尿病	通常、成人には、チルゼバチドとして週1回5mgを維持用量とし、皮下注射する。ただし、週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。 なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで効果不十分な場合は、4週間以上の間隔で2.5mgずつ増量できる。ただし、最大用量は週1回15mgまでとする。	劇、処方	R4.9.26	新有効成分
			マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット	3,848	0.5mL×2キット							
			マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1キット	5,772	0.5mL×2キット							
			マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1キット	7,696	0.5mL×2キット							
			マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1キット	9,620	0.5mL×2キット							
			マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1キット	11,544	0.5mL×2キット							
6	322	注射薬	モノヴァー静注500mg	500mg5mL1瓶	6,189	5mL×5バイアル	日本新薬	デルイソマルトース第二鉄	鉄欠乏性貧血	通常、体重50kg以上の成人には、鉄として1回あたり1000mgを上限として週1回点滴静注、又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回緩徐に静注する。 通常、体重50kg未満の成人には、鉄として1回あたり20mg/kgを上限として週1回点滴静注、又は鉄として1回あたり500mgを上限として最大週2回緩徐に静注する。 なお、治療終了時までの総投与鉄量は、患者のヘモグロビン濃度及び体重に応じるが、鉄として2000mg（体重50kg未満の成人は1000mg）を上限とする。	処方	R4.3.28	新有効成分
			モノヴァー静注1000mg	1,000mg10mL1瓶	12,377	10mL×5バイアル							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
7	429	注射薬	アーウィナーゼ筋注用10000	10,000単位1瓶	172,931	1バイアル	大原薬品工業	クリサンタスパーゼ	急性白血病（慢性白血病の急性転化例を含む）、悪性リンパ腫 ただし、L-アスパラキナーゼ製剤に過敏症を示した場合に限る。	他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、1日1回体表面積1㎡あたり25,000Uを週3回、筋肉内投与する。	劇、処方	H28.12.19	新有効成分
8	429	注射薬	イジユド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶	214,801	1.25mL [1バイアル]	アストラゼネカ	トレメリムマブ（遺伝子組換え）	①切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ②切除不能な肝細胞癌	①デュルバルマブ（遺伝子組換え）及び白金系抗悪性腫瘍剤を含む他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはトレメリムマブ（遺伝子組換え）として、1回75mgを3週間間隔で4回、60分以上かけて点滴静注する。その後、7週間の間隔を空けて、トレメリムマブ（遺伝子組換え）として、75mgを1回60分以上かけて点滴静注する。  ②デュルバルマブ（遺伝子組換え）との併用において、通常、成人にはトレメリムマブ（遺伝子組換え）として、300mgを60分以上かけて単回点滴静注する。ただし、体重30kg以下の場合の投与量は4mg/kg（体重）とする。	生物由来、劇、処方	R4.12.23	新有効成分
			イジユド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	2,311,819	15mL [1バイアル]			切除不能な肝細胞癌	デュルバルマブ（遺伝子組換え）との併用において、通常、成人にはトレメリムマブ（遺伝子組換え）として、300mgを60分以上かけて単回点滴静注する。ただし、体重30kg以下の場合の投与量は4mg/kg（体重）とする。			
9	429	注射薬	リプタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶	450,437	1バイアル（7mL）	サノフィ	セミプリマブ（遺伝子組換え）	がん化学療法後に増悪した進行又は再発の子宮頸癌	通常、成人には、セミプリマブ（遺伝子組換え）として、1回350mgを3週間間隔で30分間かけて点滴静注する。	生物由来、劇、処方	R4.12.23	新有効成分
10	449	注射薬	アドトラーザ皮下注150mgシリンジ	150mg1mL1筒	29,295	150mg/1mL×2シリンジ	レオファーマ	トラロキヌマブ（遺伝子組換え）	既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎	通常、成人にはトラロキヌマブ（遺伝子組換え）として初回に600mgを皮下投与し、その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。	生物、劇、処方	R4.12.23	新有効成分
11	617	注射薬	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶	27,924	10バイアル	旭化成ファーマ	イザブコナゾニウム硫酸塩	下記の真菌症の治療 ○アスペルギルス症（侵襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ） ○ムーコル症 ○クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））	通常、成人にはイザブコナゾールとして1回200mgを約8時間おきに6回、1時間以上かけて点滴静注する。6回目投与の12～24時間経過後、イザブコナゾールとして1回200mgを1日1回、1時間以上かけて点滴静注する。	劇、処方	R4.12.23	新有効成分
12	119	外用薬	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚	289.80	14枚（1枚×14）、28枚（1枚×28）	帝國製薬	ドネベジル	アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制	通常、軽度～中等度のアルツハイマー型認知症患者にはドネベジルとして、1日1回27.5mgを貼付する。高度のアルツハイマー型認知症患者にはドネベジルとして、27.5mgで4週間以上経過後、55mgに増量する。なお、症状により1日1回27.5mgに減量できる。 本剤は背部、上腕部、胸部のいずれかの正常で健康な皮膚に貼付し、24時間毎に貼り替える。	劇、処方	R4.12.23	新有効成分
			アリドネパッチ55mg	55mg1枚	441.40	14枚（1枚×14）、28枚（1枚×28）							
13	219	外用薬	トレブロスト吸入液1.74mg	1.74mg2.9mL1管	18,914.20	アンプル：2.9mL×30管（1袋中に6管×5袋）	持田製薬	トレブロスチニル	肺動脈性肺高血圧症	通常、成人には、1日4回ネプライザを用いて吸入投与する。1回3吸入（トレブロスチニルとして18μg）から投与を開始し、忍容性を確認しながら、7日以上の間隔で、1回3吸入ずつ、最大9吸入（トレブロスチニルとして54μg）まで漸増する。3吸入の増量に対して忍容性に懸念がある場合は、増量幅を1又は2吸入としてもよい。忍容性がない場合は減量し、1回最小量は1吸入とすること。	劇、処方	R4.12.23	新投与経路医薬品

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
14	625	内用薬	ソコーバ錠125mg	125mg1錠	7,407.40	28錠 [14錠(PTP) ×2]	塩野義製薬	エンシトレルビル フマル酸	SARS-CoV-2による感染症	通常、12歳以上の小児及び成人にはエンシトレルビルとして1日目は375mgを、2日目から5日目は125mgを1日1回経口投与する。	劇、処方、緊急承認	R4.11.22	新有効成分

- ・薬価については官報をご確認ください。
- ・承認段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。